

Taxon *Brassica oleracea* var. *gongylodes*

Název taxonu	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i>
Vědecký název taxonu	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L., DC, L., Markgr.
Český název	kedlubna
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	convar. <i>acephala</i> var. <i>gongylodes</i>
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středomoří
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Košťálová zelenina
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro osní hlízu

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tvar hlízy je kulovitý až ploše kulovitý
Kořen	nejslabší kořenový systém ze všech košťálovin
Listy	dlouze řapíkaté, na tenké bázi rozšířené, u báze řapíku je patrný žlábek, čepel mírně skadeřená, na okraji vroubkovaná, mírně laločnatá
Plody	dvoupouzdrá šešule s charakteristickým zobanem
Semena	kulovitá, tmavě hnědá, HTS 3,5 - 4,8 g
Vytrvalost	dvouletá

Doba zrání

Začátek doby zrání	Květen
Konec doby zrání	Říjen
Doba zrání - poznámka	sklizeň : Raná 15. V. - zač. VI., Letní VI. - VIII., Pozdní VIII. - X.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplota předpěstování 14 - 17°C, následně 12 - 14°C
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité naplaveniny s dostatkem humusu (4,5 a více procent)

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	vyrová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i>), plíseň brukvovitých (<i>Peronospora parasitica</i>), alternáriová skvrnitost brukvovitých (<i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i>), květílka zelná (<i>Delia radicum</i>), mšice zelná (<i>Brevicoryne brassicae</i>), dřepčík (<i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec (<i>Ceutorhynchus</i>), bělásek zelný (<i>Pieris brassicae</i>), bělásek řepový (<i>P. rapae</i>), můra zelná (<i>Mamestra brassicae</i>), můra kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>), osenice polní (<i>Agrotis segetum</i>), záprředníček polní (<i>Plutella xylostella</i>), molice vlašťovičnicková (<i>Aleyrodes proletella</i>), bejlmorka zelná (<i>Contarinia nasturtii</i>), třásněnka (<i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	raná 0,25 x 0,25 m, letní 0,3 - 0,4 x 0,3 - 0,4, pozdní 0,4 x 0,4 m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)