

Taxon Vitis vinifera Veltlinske zelene

Název taxonu	Vitis vinifera Veltlinske zelene
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Veltlínské zelené’ (VZ)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Grüner Veltliner, Weissgipfler, Zöld veltelini
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	pravděpodobný původ je rakouský, odrůda vznikla spontánním zkřížením odrůd ‘Tramín’ x ‘St. Georgen’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, šedohnědé až žlutavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté s hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, lehce překrytý; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý, vespod plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá středně velká, zelenožlutá
Semena	velká, hruškovitá, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Müller Thurgau’ (VZ má však pozdější zrání)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité i suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	do hlubších humóznějších půd SO 4, CR 2 a T 5C, do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože LE-K/1, Kober 125 AA i 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití	bílá mošťová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost	středně pozdní až pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Odrůdy	klony VP-3/6, VP-4/10, VP-6/2, ZN-1/49 a ZN-10/45
Popis vína	vůně vína je jemně muškátová až medově lipová, chuť je pepřně kořenitá s příjemnou hořčinkou, z kamenitých půd až mandlová
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 113)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---



