

Taxon Ribes nigrum ‘Ojebyn’

Název taxonu	Ribes nigrum ‘Ojebyn’
Vědecký název taxonu	Ribes nigrum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Öjebyn’
Český název	meruzalka černá
Synonyma (zahradnický pou..	Ribes cyathiforme, Ribes pauciflorum, Botrycarpum nigrum, Grossularia nigra
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Ribes

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Švédsko

Zařazení

Pěstitelská skupina Bobulovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř: polorozložitý tvar
Listy	středně velké, třílaločné až pětilaločné, matné, trochu drsné,
Květy	středně velké, baňkovité, dobře se opyluje
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen krátký, průměrně 6 bobulí/hrozen, sytě černé, kyselosladké, výrazné chuti
Možnost záměny taxonu (+..	Větší, sytě zelený, vrásčitý list, nerovný (až prohýbaný) růst obrostu, kratší kompaktní hrozen, bobule tužší konzistence.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná, od 25. dubna do 12. května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka raná, konec června

Nároky na stanoviště

Faktor tepla nejvhodnější středně teplé oblasti, náchylná na jarní mrazíky zvláště v květu

Faktor vody	vhodné je zavlažování
Faktor půdy	půdy hlinité, dobře zásobené živinami

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	základní tvar je keř, stromek není testován
Řez	náročná na prosvětlovací řez

Užitné vlastnosti

Použití	zejména pro zmrazení, dále přímý konzum, konzervárenství
Choroby a škůdci	středně odolná proti rzi vejmutovkové
Růstové i jiné druhově spec..	středně bujný
Plodnost	nástupuje do plodnosti po 3. roce od výsadby, střední, průměrná (1,8-2,5 kg/keř), vhodná pro mechanizovanou sklizeň

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba drobného ovoce\)](#)

Grafické přílohy

