

Taxon Vitis vinifera Neuburske

Název taxonu	Vitis vinifera Neuburske
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Neuburské´ (Ng)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Neuburgské, Neuburger, Fehér Neuburgi, Novogradski
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patrně rakouská odrůda, pravděpodobně vznikla nahodilým křížením odrůd ´Veltlínské červené´ x ´Sylvánské zelené´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je hnědé, silnější a po celé délce čárkované a tečkované
Pupeny	velké, tupé
Listy	středně velké, okrouhlé, tři až pětilaločnaté s mírnými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; čepel vrásčitá, vespod mírně ochlupená
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký kuželovitý hrozen, hustý, s krátkou stopkou; bobule je kulatá, středně velká, zelená až zelenožlutá, tečkovaná
Semena	středně velká, elipsoidní, zobáček je zašpičatělý
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody vhodné jsou i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží, není náročná na půdu, nesnáší přehnojení dusíkem - sprchává

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož na hlubokých úrodných půdách SO 4 či T 5C, na lehčích půdách CR 2 či Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci citlivá zejména na houbové choroby, napadána obaleči
Plodnost středně pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit také hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína víno má svěží kyselinu, ovocně kořenitou vůni a chuť po ořechu, grepu či banánu
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže, sekty

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 122\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

