

Taxon Vriesea splendens

Název taxonu	Vriesea splendens
Vědecký název taxonu	Vriesea splendens
Jména autorů, kteří taxon p...	(Brongn.) Lem. (1850)
Synonyma (zahradnický pou..	Tillandsia splendens Brongn.; Vriesea splendens var. longibracteata (Baker) L.B. Sm.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Vriesea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše, Karibská oblast a Orinocká oblast
Biogeografické regiony - po..	Venezuela, Surinam, Francouzská Guayana

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velikostně proměnlivá epifytická či terestrická rostlina, husté a široce nálevkovité listové růžice; výška růžic 30-40 cm
Listy	uspořádány do růžic; dlouze čárkovité, prohnuté, až 80 cm dlouhé s nepatrnými pochvami; modrozelené listy mají poměrně široké příčné pruhy, tmavě zelené, červeno hnědé až nafialovělé barvy; měkké s hladkým okrajem
Květenství	zloštělé dvojřadé hrozny úzce kopinatého tvaru, které se podobají klasům, dorůstají až 100 cm výšky; složené z šarlatově červených listenů a trubkovitých žlutých květů; vyrůstá ze středu růžice v létě nebo na podzim
Květy	žluté, trubkovité délky až 8 cm; kališní plátky mají často červené vrcholy
Možnost záměny taxonu (+..	možno zaměnit s dalšími druhy čeledi Bromeliaceae (např. Tillandsia, Guzmania, Aechmea, atd.), rozdíly jsou především v uspořádání listových růžic, tvarech květů a okrajích listů
Dlouhověkost	rostlina po odkvětu odumírá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Prosinec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé až polostinné; v létě ne na plné slunce
Faktor tepla	teplý skleník; rostlina vysoce náročná na teplo v zimě (16-22 °C)
Faktor vody	v období vegetace udržovat stálou mírnou vlhkost substrátu, kromě zimního období by měla být naplněna vodou i listová nálevka; vyšší vzdušná vlhkost, časté rosení; zálivka i rosení měkkou vodou o pokojové teplotě
Faktor půdy	substráty pro pěstování epifytických rostlin s přídavkem hrubé rašeliny, rašeliníku, listovky a kompostu; teplota substrátu nad 18°C; pH 5,0 - 5,5
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	uzavřené květinové okenní vitríny; hybridy jako krátkodobá dekorace květem pro otevřené interiéry
Choroby a škůdci	listové mšice v období kvetení; poškození listů při nadbytečné vlhkosti substrátu nebo v suchém vzduchu

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	výsevy klíčů na světlo

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Poznámka	vrizea; "hořící meč"
Odkazy	• http://www.tropicos.org/Name/4301510?tab=references

