

Taxon Vitis vinifera Zweigeltrebe

Název taxonu	Vitis vinifera Zweigeltrebe
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Zweigeltrebe´ (Zw)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Zweigelt Blau, Rotburger, Klosterneuburg 71
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o rakouskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Svatovavřínecké´ a ´Frankovka´

Zařazení

Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavohnědé
Pupeny	malé, širší, zahrocené
Listy	středně velké až velké, mělce tří až pětilaločnaté, bazální výkroj je lyrovitý, většinou otevřený; povrch vrásčitý, tmavě zelený
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je středně velký, kuželovitý, hustý; bobule je středně velká, kulatá, modročerná
Semena	středně velká, hruškovitá, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	André (Zw má širší a otevřený bazální výkroj)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vhodné jsou i lehčí vápenité půdy
Faktor půdy	spraše, úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vysoké i střední vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	zejména CR 2 či Kober 125 AA, do úrodnějších půd i SO 4 či Binova

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, obaleči
Plodnost	středně pozdní až pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Odrůdy	klony PO - 36/32, PO - 36/41, PO - 36/46, PO - 37/33, PO - 37/42
Popis vína	víno je tříslvité, mávě červené se svěží ovocnou vůní a plnou chutí připomínající třešně, višně či švestky
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, rosé a kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 114\)](#)

