

# Taxon Ajuga tenorii

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Název taxonu                   | Ajuga tenorii                  |
| Vědecký název taxonu           | Ajuga tenorii                  |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">C. Presl</a>       |
| Odrůda                         | ‘Chocolate Chip’               |
| Český název                    | zběhovec bezlodyžný            |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Ajuga acaulis Brocchi          |
| Autor                          | Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>         |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Lamiaceae</a>      |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | italský endemit - od Abruzz po Sicílii          |

## Zařazení

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | horské skalnaté lesy, převážně na vápencích, mezi 1200-2200 m n.m. |
| Pěstitelská skupina           | Trvalka stálezelená a Trvalka polostálezelená                      |
| Životní forma                 | Hemikryptofyt                                                      |
| Životní forma - poznámka      | přechodné typy hemikryptofyt - chamaefyt (protohemikryptofyt)      |
| Zařazení podle původu, nár... | Di - divoce rostoucí trvalka                                       |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | trsnatě poduškovitá až kobercovitá trvalka, za květu do 0.1 m vysoká                                                             |
| Kořen            | adventivní z plazivých oddenků                                                                                                   |
| Výhony           | hrnaté, sterilní stolony plazivé a ukončené rosetami, kvetoucí přímé, nevětvené, olysávající                                     |
| Listy            | elipčité lopatkovité v drobných přizemních růžicích, oddáleně tupě zubaté nebo celokrajné, roztroušeně chlupaté nebo téměř lysé  |
| Květenství       | klasnatě sblížené lichopřesleny chráněné kopinatými listeny                                                                      |
| Květy            | zygomorfní, různobalné, srostloplátečné, pětičetné s redukovaným horním a tojlaločným spodním pyskem, modré, se čtyřmi tyčinkami |
| Opylovací poměry | Částečně samosprašná                                                                                                             |
| Plody            | elipčité tvrdky s elaiosomem                                                                                                     |
| Semena           | vysévány jsou celé plody                                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Možnost záměny taxonu (+.. | chybně bývá nabízena jako <i>Ajuga reptans</i> L., zaměnitelná však snad jen s téměř nepěstovanými východoasijskými druhy ( <i>Ajuga pygmaea</i> A.Gray s listy zvlně vykrajovanými a květy soliterními v terminálních axillách, <i>Ajuga decumbens</i> Thunb. s listy nepravidelně zubatými) |
| Dlouhověkost               | relativně krátkověká, z nevhodných stanovišť rychle mizí                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doba rašení                | Brzy na jaře rašící (II-III)                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                                       |
| Faktor světla - stín     | ✓                                                                                                       |
| Faktor tepla             | mrazuvzdorná do -28°C až -36°C (USDA), pestrolisté odrůdy citlivější                                    |
| Faktor vody              | na vodu náročný mezofyt                                                                                 |
| Faktor půdy              | propustná, ale vododržná, spíše neutrální (pH 5.8-7.2), nezasolená (EC do 1.0 mS.cm), humózní a výživná |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                                                                       |
| Faktor půdy - poznámka   | přízpůsobivá, upřednostňuje karbonátové podklady                                                        |

## Užité vlastnosti

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití - pro trvalky       | OPD - Okraj porostu dřevin a A - Alpinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Choroby a škůdci            | početné askomycety: <i>Sphaerotheca</i> , <i>Ramularia</i> , <i>Athelia</i> ( <i>Sclerotium</i> ), <i>Colletotrichum</i> , <i>Alternaria</i> , <i>Corynespora</i> , <i>Myrothecium</i> , <i>Stemphylium</i> , <i>Botryotonia</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Pythium</i> , <i>Fusarium</i> ; ze škůdců svilušky ( <i>Tetranychus</i> ), mšice ( <i>Myzus</i> ), háďátka ( <i>Meloidogyne</i> , <i>Pratylenchus</i> ) |
| Doporučený spon pro výsad.. | 25-35 rostlin na m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Množení

|               |                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení       | Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)                                                                                 |
| Konečné hrnky | 8-12 cm                                                                                                                       |
| Květní tvorba | neutrální k délce dne, nutná je nejspíš vernalizace - exaktní data dosud málo známa                                           |
| Odrůdy        | Několik málo odrůd lišících se vybarvením listů: zelenolistá 'Emerald Chip', bronzově purpurové 'Valfredda' ('Chocolate Chip' |

- obchodní jméno) a 'Mauro', pestrolisté 'Vanilla Chip' a 'Toffee Chip'

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 9: záhon - svah podél budovy D na straně... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...

'Chocolate Chip' - X/2017

Dodavatel

'Chocolate Chip' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi

Odkazy

- Colombo P, Lentini F. (2002): Morphology, anatomy and ecology of *Ajuga tenorii* (Lamiaceae). Quad. Bot. Ambient. Appl. 13: 93-98

## Grafické přílohy

---

