

Taxon Vitis vinifera Flamengo

Název taxonu	Vitis vinifera Flamengo
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Flamengo’ (Fg)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	XV-7-72
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Nimrang’ x ‘Muškát arménský’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s výraznými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký až velmi velký, kuželovitý, spíše řidší hrozen; bobule je kulatá, velká až velmi velká, fialovo růžové barvy
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažen
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	červená stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	střední až vyšší odolnost k houbovým chorobám, citlivá k plísni šedé
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, při přezrání až sliznatá, bílé barvy, chuť je kyselková

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 128\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

