

# Taxon *Prunus persica* 'Elberta'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Elberta'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(L.) Batsch</a>
Odrůda	'Elberta'
Český název	broskvoň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Elberta pozdní'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. r. 1870, USA, Georgia

## Zařazení

---

Fytocenologický původ křížení 'Pavie chinese' x 'Early Crawford'  
Pěstitelská skupina Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	mohutné, vzpřímené a široké koruny
Pupeny	listové jsou středně velké, dlouze vejčité, středně odstávají, květní jsou středně velké, vejčité, středně odstávají
Listy	velké, široké, s výraznou žilnatinou
Květy	středně velké (16 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou oválné, tmavě růžové
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev, velké (130-160 g), oválně vejčité, nesouměrné, slupka je středně tlustá, značně plstnatá, dobře loupatelná, zelenožlutá s červeným líčkem přecházejícím v tmavší tečkování, dužnina je tuhá, jemně zrnitá, kořenitá, sladce navinulá, s typicky někdy i nahořklou broskvovou příchutí, žlutě oranžová, kolem pecky karmínově červená, dobrá odlučitelnost
Možnost záměny taxonu (+..	Vzrůst, lenticely, list (báze), žlásky, květy, znaky a vlastnosti plodu, doba zrání.

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka středně raná, od 17. dubna do 23. dubna

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka 25-30 dnů po 'Redhaven'

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla velmi náročná na teplo, citlivá na silnější mrazy, květy jsou dolné vůči pozdním jarním mrazíkům

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení nejvhodnějším tvarem je zákrsek s kotlovitou korunou  
Řez vyžaduje delší řez, mírné zmlazení snáší  
Podnož semnáče broskvoně typu B-VA-1 až B-VA-4 a broskvomandloň BM-VA-1

## Užitné vlastnosti

---

Použití přímý konzum, zpracování  
Choroby a škůdci značně náchylná na kadeřavost  
Růstové i jiné druhově spec.. velmi bujný růst  
Plodnost 4. rokem po výsadbě, dobrá, pravidelná

## Množení

---

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

## Ostatní

---

Poznámka Vhodná odrůda jen do nejteplejších oblastí a chráněných stanovišť, kde jediné dozrává a při závlaze a dobrém ošetřování dává vysoké výnosy plodů vhodných jak ke stolnímu použití, tak i pro zpracování na kompoty. Zde se uplatňuje jak ve velkovýsadbách, tak i v zahrádkách. V průměrných rajónech jižní Moravy je dnes málo perspektivní odrůdou.

## Grafické přílohy

---

