

Taxon Rhamnus cathartica

Název taxonu	Rhamnus cathartica
Vědecký název taxonu	Rhamnus cathartica
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	řešetlák počistivý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Rhamnus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Asie, severozápadní Afrika, Severní Amerika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř, zřídka nízký strom
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, trnitý, někdy stromkovitý, vícekmínkový keř (až 8 m), jinak ale široce vejčitý a kolem 3 m vysoký keř
Výhony	letorosty stříbrošedé až hnědavé
Pupeny	pupeny jsou (šikmo) vstříčné, podlouhle vejcovité, 3–7 mm dlouhé a fialovohnědé nebo hnědé
Listy	listy vejčité až eliptické či okrouhlé, 3-7 cm, okraj jemně vroubkovaně pilovitý, 2-5 párů žilek, řapíky 6-25 mm
Květenství	úžlabní vrcholík, po 2-8 květech
Květy	květy 4četné, kališní lístky 2-3 mm, korunní 1-1,3 mm
Plody	plody černé nebo žluté, 5-8 mm široké
Kůra a borka	kůra je červenohnědá a lesklá, podobná Prunus
Dlouhověkost	krátkověká dřevina

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	stanoviště slunné až polostinné
Faktor tepla	oblast až IV
Faktor vody	sušší až mírně vlhké půdy
Faktor půdy	na půdách sušších až mírně vlhkých, převážně zásaditých (vápnitých)

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ, ale nevýrazný, podzim - plody
Použití	rozptýlená zeleň

Množení

Množení	Předpěstování sadby
Množení - poznámka	osivo před výsevem necháváme raději rok ve stratifikaci v křemičitém písku s rašelinou, vyséváme až následující jaro