

Taxon Prunus cerasus

Název taxonu	Prunus cerasus
Vědecký název taxonu	Prunus cerasus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	višeň obecná
Synonyma (zahradnicky pou..	Cerasus vulgaris Mill.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř nebo strom
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	menší strom nebo keř asi 3 - 10 m vysoký s korunou kulovitou, širokou a nepravidelnou, hustě zavětvenou; kmen se často větví již nízko u země
Výhony	letorosty hladké, lysé, slabší než u Prunus avium a daleko odstávající, často obloukovitě převislé
Pupeny	červenohnědé, drobné
Listy	vejčité nebo elipčité, 4 - 8 cm dlouhé a 2 - 5 cm široké, jemně pilovité nebo zubaté, kožovité, na líci lesklé a lysé, na rubu světleji zelené a pouze na žilkách velmi slabě chlupaté; řapík 1 - 3 cm dlouhý s 1-2 žlázkami
Květy	korunní lístky čistě bílé, téměř okrouhlé; jednotlivé květy 2-3 cm široké uspořádané v okolících po 2-5; květní stopky 2-4 cm; kvete v dubnu až květnu
Plody	peckovice 1-2cm široké, téměř kulovité, hladké, černočervené, kyselé
Kůra a borka	hnědočervená, šedohnědá, s hodně lenticelami; borka se loupe
Možnost záměny taxonu (+..	Prunus x eminens (větve šikmo vzpřímené, korunní lístky na konci vykrojené, pecka kulovitá bez špičky); Prunus avium (popisovaný

druh je ale hustší a uzavřenější a jemněji stavěný, tenčí větve a menší kožovitější listy)

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Duben
Konec doby kvetení Květen

Doba zrání

Začátek doby zrání Květen
Konec doby zrání Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla dřevina vyžadující slunná stanoviště, snese i polostín
Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - polostín ✓
Faktor tepla nenáročný a odolný druh, oblasti I-IV
Faktor vody odolná k suchu, nesnáší dlouhodobé zamokření
Faktor půdy na půdu nenáročná dřevina

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... žluto-oranžové až červené podzimní zbarvení
Použití - pro trvalky OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití do menších objektů, sady, zahrady v parcích do okraje skupin, solitera v přírodě bližších objektech, k tvorbě detailu
Růstové i jiné druhově spec.. krásná hustá a jemná textura habitu, bílé květy, žluto-oranžové až červené podzimní zbarvení

Množení

Množení Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním
Odrůdy 'Plena' - květy poloplňné, bílé; 'Rhexii' - květy plné, čistě bílé;
'Semperflorens' - květy nepřetržitě od jara do podzimu, větve mírně převislé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)

- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)
- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)