

Taxon Stachys citrina

Název taxonu	Stachys citrina
Vědecký název taxonu	Stachys citrina
Jména autorů, kteří taxon p...	Boissier & Heldreich (Bentham, 1848)
Český název	čistec citronový
Synonyma (zahradnický pou..	Stachys chamaesideritis Boiss.& Balansa
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	subsp. chamaesideritis (Boiss.& Balansa) Bhattacha

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	anatolská pohoří

Zařazení

Fytocenologický původ	petrofyt (koryfofyt): suché skály na slunných svazích do alpinského stupně 2200 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená a Polokeř stálezelený
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	polštářovitě rozrůstavý (0.1 m, za květu dvojnásob), stříbřitě hedvábitě vlnatá trvalka / polokeř s přímými kvetoucími lodyhami
Kořen	adventivní z plazivých oddenků
Výhony	přímé nebo vystoupavé, nevětvené, 0.2-0.3 m vysoké, hranaté, přitiskle běloplstnaté, vstřícně olistěné
Listy	vejčité elipčité, ve sterilních růžicích řapíkaté a stěžítě dva palce dlouhé (lodyžní drobné a přisedlé), hustě hedvábitě vlnaté, zdánlivě celokrajné (pod oděním s okraji jemně vroubkovanými)
Květenství	šestikvěté až osmikvěté přesleny stažené v kompaktní lichoklas
Květy	souměrné, různobalné, s pětizubými kalichy a čtyřlaločnými korunami s nápadným spodním pyskem, na palec dlouhé, pýřité, bledě žluté
Plody	obvejčité hnědé tvrdky bez okrasné hodnoty
Semena	(vysévají se celé tvrdky)
Možnost záměny taxonu (+..	bývá zaměňován s podobnými taxony sekce Infrarosularis jako jsou S. chrysantha Boiss.& Heldr. (listy téměř okrouhlé) anebo S. iva

	Griseb. (listy lineárně elipčité), oba bez sterilních růžic a s květy zlatožlutými v přeslenech často jen čtyřkvětých; podobné i některé druhy blízkého rodu <i>Sideritis</i> (menší květy s krátkými spodními pysky - viz příloha)
Dlouhověkost	krátkověká, limitovaná zimním vlhkem
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	heliofyt
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -24°C, možná až -28°C (USDA)
Faktor vody	xerofyt, tolerantní suchu za vysokých letních teplot
Faktor půdy	propustná, skeletnatá, neutrální až zásaditá (pH 6.5-8.0)
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	v chudých půdách s bohatším oděním a lépe přezimuje

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně bíle vlnatým olistěním, k počátku léta květenstvím
Použití - pro trvalky	KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	St 1 so, příležitostně FS 1 so; slunná a suchá stanoviště
Choroby a škůdci	Erysiphe (<i>Neoerysiphe</i>)
Růstové i jiné druhové spec..	rzi (<i>Puccinia</i>), askomycety: <i>Neoerysiphe</i> , <i>Sphaerotheca</i> , <i>Septoria</i> , <i>Cercospora</i> , <i>Cylindrosporium</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Sclerotium</i> , <i>Phyllosticta</i> , <i>Ramularia</i> ; ze škůdců mšice (<i>Aphis</i> , <i>Myzus</i> , <i>Cryptomyzus</i>), můry (<i>Heterocampa</i>), háďátka (<i>Pratylenchus</i> , <i>Meloidogyne</i>)
Doporučený spon pro výsad..	14-20 rostlin na m ² - zpravidla ale vysazována v menších skupinkách

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Dělení trsů a Množení oddělků
Konečné hrnky	8-10 cm kontejnery
Květní tvorba	pravděpodobně dlouhodobí - exaktní data málo známa

