

Taxon Akebia quinata

Název taxonu	Akebia quinata
Vědecký název taxonu	Akebia quinata
Jména autorů, kteří taxon p...	(Houtt.) Decne
Český název	akebie pětičetná
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Akebia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Íránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	střední Čína, Japonsko, Korea

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	ovíjivý keř, 6-12 m vysoký
Výhony	fialově nachové letorosty
Pupeny	pupeny střídavě uspořádané, světle červenohnědé, kryté celokrajnými šupinami
Listy	listy dlanitě složené, (3-)5(-7)četné, s 4,5–10 cm dlouhým tenkým řapíkem, lístky eliptické až obvejčité, 3-6 cm dlouhé, celokrajné, na líci tmavě zelené, na rubu sivé s 1–2 cm řapíčky
Květenství	hrozen
Květy	purpurově hnědé, vonné, samičí 2-3 cm v průměru, samčí mnohem menší a světlejší
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	plody 4-9 cm dlouhé, světle fialové, ojínné, jedlé dužnaté měchýřky
Semena	černá, lesklá
Kůra a borka	větve lysé
Možnost záměny taxonu (+..	A. trifoliata - 3četné listy, lístky mělce vroubkované nebo na okraji zvlňené
Dlouhověkost	krátkověká dřevina
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Srpen
Doba zrání - poznámka	v našich podmínkách v září až v říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	v oblastech teplejšího klimatu je velmi přizpůsobivá a schopna snášet i stín a sucho, prospívá na celém území ČR mimo horské oblasti, plodí pouze v I. výrobní oblasti
Faktor vody	vlhké půdy
Faktor půdy	Daří se jí na dobře propustných vlhčích lehkých písčitých, hlinitých, ale i jílovitých půdách, je indiferentní k pH

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vysazujeme k opoře u zdi, besídky nebo pergoly, ale můžeme nechat plazit i po zemi bez opory
Řez	řez nevyžaduje

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období rašení - březen, duben, období kvetení - duben a květen, olistěním po celou dobu vegetace
Použití	pro popnutí pergol a jiných konstrukcí - jemnější úpravy
Choroby a škůdci	u nás netrpí ani chorobami ani škůdci

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky a Hřížení
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem](#)
- [D 7: záhon před hlavním vchodem do budovy... / ZF - D -](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... VII/2020