

Taxon Ficus rubiginosa

Název taxonu	Ficus rubiginosa
Vědecký název taxonu	Ficus rubiginosa
Jména autorů, kteří taxon p...	Desf.ex Vent. (1804)
Odrůda	‘Variegata’
Český název	fíkovník zrezavělý
Synonyma (zahradnický pou..	Ficus australis Willd.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. lucida Maiden
Nadřazená kategorie	Ficus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Australská květenná říše a oblast australského severovýchodu
Biogeografické regiony - po..	Queensland a New South Wales

Zařazení

Fytocenologický původ	elafofyt, petrofyt - tropické monzunové lesy, stinná skaliska
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom zřídka přes 12 m vysoký, často hemiepifyt (škrtič) nebo lithofyt
Kořen	početné temně hnědé adventivní kořeny
Výhony	letorosty silné, často poněkud zploštělé, žláznatě pýřité až rezavě plstnaté, olysávající, spirálně olistěné
Listy	elipčité nebo obvejčité, do 0.2 m dlouhé, temně zelené, kožovité a voskově lesklé, vespod roztroušeně rzivě pýřité, olysávající; palisty vlnatě plstnaté nebo někdy lysé, opadavé
Květenství	přisedlá, elipčítá sykonia uzavírající květy (fíky), párovaná, s bradavčitě vyniklými ostioly, lysá nebo rzivě pýřitá, po uzrání žlutá, oranžově hnědá nebo hnědopurpurová
Květy	drobné s masitými, s 3-5 bílými nebo načervenalými tepaly - samčí stopkaté s jedinou tyčinkou, samičí a hálkové často přisedlé
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	drobné vejčité nažky
Semena	neoddělitelná od nažek

Možnost záměny taxonu (+..	občas zaměňována s jinými druhy skupiny <i>Malvanthera</i> - především s australsko-malesijskou <i>F. obliqua</i> L. (listy tupě hrotnaté a oboustranně lysé - právě tato často nabízena jako <i>F. australis</i>) nebo <i>F. macrophylla</i> Pers. (listy větší s bělavými řapíky a žebry, v mládí rovněž rzivě pýřité)
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	starší rostliny kvetou za dostatku světla, nepravidelně, příležitostně celoročně (bez okrasné hodnoty)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světломilná, ale přizpůsobivá dlouhodobému nedostatku světla (méně než 1 klux!); produkce 48-64 klux, k déleodobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 2.0-4.0 klux; pod 0.5 klux shazování listů
Faktor tepla	20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C léto (za vyšší RVV i optimum teplot vyšší), 18°C-20°C v zimě
Faktor vody	RVV: produkce 80% a více, prodejní haly 60%-80%, v bytech nejméně 40%; za vysoké vzdušné vlhkosti sílí tvorba vzdušných kořenů
Faktor půdy	především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 5.5-6.5

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Choroby a škůdci	rzi (<i>Physopella</i> , <i>Cerotelium</i>) a početné deuteromycety (<i>Colletotrichum</i> , <i>Macrophoma</i> , <i>Diplodia</i> , <i>Septoria</i> , <i>Glomerella</i> , <i>Cercospora</i> , <i>Pellicularia</i> , <i>Corynespora</i>); ze škůdců svilušky (<i>Eotetranychus</i> , <i>Aceria</i>), červci (<i>Planococcus</i> , <i>Ceroplastes</i> , <i>Paratachardina</i>), třásněnky (<i>Gynaikothrips</i>), molice (<i>Singhiella</i> , <i>Paraleyrodes</i>), bejlomorky (<i>Horidiplosis</i>), háďátka rodů <i>Pratylenchus</i> a <i>Aphelenchoides</i>
Doporučený spon pro výsad..	produkce: 6 cm množárenské hmký 128-160 /m ² ; 9-10 cm mezihmký 48-56 /m ² ; v konečných 12 cm hmkách 20-28 /m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	především vrcholové řízky s 3-5 listy: rychleji zakoření a rychleji rostou
Mezihrnky	řízky - multipack nebo hrnky 6 cm, přehrnkování do 9-10 cm mezihrnků anebo (v případě expedice malých rostlin) do konečných 12 cm hrnků
Konečné hrnky	hrnky 12-16 cm a více v závislosti na velikosti expedovaných rostlin
Retardace	ne
Doba kultivace	v 12 cm hrnkách v létě šestnáct - dvacet týdnů, v zimě do 30 týdnů
Odrůdy	bíle mramorovaná 'Variegata'

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky	VBN 2010: 828 tis. prod.hrnků v kategorii "Ficus overig" (2.5 mil.eur), obrat F. rubiginosa nevyčíslen (VBN 1990: F. rubiginosa 'Variegata' tisíc hrnků s obratem dvou tisíc Hfl)
Odkazy	• Berg C.C.& Corner E.J.H (2005): Flora Malesiana vol.17-2 Moraceae- Ficus, Nat.Herb.Nederland, Leiden; Rijn B.G.M., Hetterschied W.L.A., Likkien V.P.A. (1988): Sortiment Ficus onder de loep. Vakblad voor de Bloemisterij (91) 49: 37- 48; Ronstead N.& al.(20

Grafické přílohy



