

Taxon *Pyrus salicifolia*

Název taxonu	Pyrus salicifolia
Vědecký název taxonu	Pyrus salicifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	Pall.
Český název	hrušeň vrbolistá
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Pyrus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	suché kamenité svahy, řdkolesy, křoviny

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stromek 4-6 m vysoký, větve obloukovitě převislé
Výhony	letorosty tenké, dlouho šedobíle plstnaté, krátké prýty většinou kolcovité
Pupeny	střídavé, plstnaté
Listy	čárkovitě kopinaté až kopinaté, 3-9 cm dlouhé, 1-1,5 cm široké, na rubu bělavě chlupaté, většinou celokrajné, na okraji dlouze vlnaté
Květenství	kulovitý chocholík
Květy	po 6-8, bílé
Plody	malvice, většinou charakteristicky "hruškovité", 2 cm dlouhé, žlutohnědé
Kůra a borka	kůra lesklá, červenohnědá, borka šedohnědá, šupinovitá
Možnost záměny taxonu (+..	Elaeagnus angustifolia (plody elipčité, stříbrné)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světломilná dřevina
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblasti I-III, mají rády teplé polohy
Faktor vody	vyhovující jsou stanoviště s nepříliš vlhkou půdou, výborně snáší suchá stanoviště
Faktor půdy	vhodné polohy jsou hluboké a živné půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití	solitéra nebo okraje skupin na tmavé pozadí
Růstové i jiné druhově spec..	stříbrné olistění, květ

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	očkováním v létě a roubováním na jaře, semeno špatně klíčí
Odrůdy	‘Pendula’ - má výrazněji převislé větve

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)