

Taxon *Panicum capillare*

Název taxonu	<i>Panicum capillare</i>
Vědecký název taxonu	<i>Panicum capillare</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	proso vláskovitě
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Poaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	mírne pásmo SA - stepi, ojediněle i v jižní Americe; zavlečený do Asie a Evropy - především s dovozem zemědělských komodit; občas u nás v teplých oblastech splaňuje kolem železničních tratí

Zařazení

Fytocenologický původ	primárně osídluje otevřené plochy - prerie, okraje cest, polí, sadů; sekundárně šířen železniční a námorní dopravou
Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Životní forma	Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzdušná, jemná, trsnatá tráva, v pěstování nejčastěji 50 - 60 cm vysoká v době květu
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, pevná, okrouhlá, hrubá, nevětvená nebo už od báze rozvětvená, hustě jemně pýřitá
Listy	ploché, 10 - 40 cm x 1 - 1,5 cm, na konci zašpičatělé, s odstávajícími, často až 1 cm dlouhými velmi jemnými chloupky a s výrazně chlupatou pochvou
Květenství	velmi jemná, vzdušná 5 - 20 cm dlouhá lata drobných klásků nesených niťovitými větévkami; nejatraktivnější v době otvírání z pochvy listu, kdy trychtýřovitě vytryskne a jemně přepadá do stran
Květy	lichoklas s osinami
Plody	obilka elipčitá, 1,5 mm velká, zprvu zelená, posléze světle hnědá

Vytřvalost v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červenec

Konec doby kvetení Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti

Faktor tepla teplomilný taxon vyžadující předpěstování

Faktor vody zahradní půda s občasou zálivkou; k sušší půdě tolerantní

Faktor půdy živné, propustné, písčitohlinité půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - slabě kvete nebo nemusí vůbec zakvést

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického účinku velmi dekorativní od července do konce vegetačního období

Použití - pro trvalky VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon

Použití Solitérní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - nutno sklízet na počátku metání. Lichklasy se i tak mohou rozpadat.

Růstové i jiné druhové spec. cenná pro svoji velmi jemnou texturu a svěže zelenou barvu

Doporučený spon pro výsad. 7ks/m²

Množení

Množení Předpěstování sadby

Množení - poznámka předpěstování ze semen v dubnu. Výsadba na záhon v druhé polovině května. Někdy se přesévá.

Odrůdy 'Fontaine' - bohatě kvetoucí kultivar s načechralým kvetenstvím

Grafické přílohy

