

Taxon Exochorda racemosa

Název taxonu	Exochorda racemosa
Vědecký název taxonu	Exochorda racemosa
Jména autorů, kteří taxon p...	(Lindl.) Rehder
Český název	hroznovec hroznatý
Synonyma (zahradnicky pou..	E. grandiflora Lindl.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý 2-4 m vysoký keř s rozkladitým vzrůstem
Výhony	letorosty červenohnědé, nakonec hnědé, s lenticelami, lysé
Pupeny	střídavé, tmavě purpurové a trojúhle vejcovité, lysé, tupé
Listy	listy podlouhlé až obvejčité, 3-8 cm, špičaté, celokrajné nebo v horní části pilovité, svrchu světle zelené, řapíky 5-15 mm
Květenství	vzpřímené hrozny po 6-12 květech
Květy	květy bílé, asi 3-4 cm široké, korunní lístky okrouhlé
Plody	pětipouzdrá tobolka vzniklá srůstem měchýřků

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilná, snese polostín
Faktor tepla	oblast I-II
Faktor vody	snese sucho
Faktor půdy	vyhovuje jí živná, propustná zahradní zemina

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... V-VI - květ

Použití keř ozdobný květem, jako solitera i do skupin keřů

Množení

Množení Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Hřížení