

Taxon Spiraea nipponica ‘Snowmound’

Název taxonu	Spiraea nipponica ‘Snowmound’
Vědecký název taxonu	Spiraea nipponica
Jména autorů, kteří taxon p...	Maxim.
Odrůda	‘Snowmound’
Český název	tavolník nipponský
Synonyma (zahradnický pou..	Spiraea bracteata
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Spiraea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: Japonsko

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Rozložitý keř, větve vzpřímené až stmulé, roční přírůstek je 15 až 30 cm, v mládí až 40 cm, keř dosahuje v 10 letech výšky 1,4-1,6 m; v 25 letech výšky 1,6 - 2,2 m
Výhony	hrnaté, červenohnědé
Listy	obvejčité, v horní části vroubkované, na líci tmavozelené, lysé, na rubu šedozelené, 1,5-3 cm dlouhé, opadavé
Květenství	květy v okolíčnatých hroznech
Květy	čistě bílé
Plody	měchýřky pukající břišním švem, na švu chlupaté

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	kvete bohatě koncem května až začátkem června

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor světla - poznámka	špatně snáší horký a suchý úpal při letních vedrech
Faktor tepla	Zóna 4 (- 34 °C)
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	pH mírně kyselé až mírně zásadité, roste v běžné zahradní půdě

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	po odkvětu, prosvětlování starších keřů
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době květu
Použití	okrasný keř - solitera, skupiny, zahuštěné výsadby, pro tvarované a především volně rostoucí jednořadé živé ploty

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	nejčastější je množení řízkováním, za použití bylinných řízků, termín odběru červen - červenec, nebo za použití dřevitých řízků

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
------------------------------	------