

Taxon Viburnum farreri

Název taxonu	Viburnum farreri
Vědecký název taxonu	Viburnum farreri
Jména autorů, kteří taxon p...	Stearn
Český název	kalina vonná
Synonyma (zahradnický pou..	Viburnum fragrans
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Viburnum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Pochází ze severní oblasti Číny, provincie Gansu, kde je také často pěstována v zahradách

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Opadavý, široce vejcovitě protáhlý a vzpřímený, středně hustě větvený keř, mnohé větve jsou téměř vodorovně postavené, výška 1.5–3(–5) m
Výhony	letošní větévky zelené a téměř lysé, větévky ložského roku červenohnědé, později šedohnědé nebo šedobílé
Pupeny	zimní pupeny elipsoidní, špičaté
Listy	Listy eliptické nebo (kosočtverečně) obvejčité či vejčité, 30–100 × 10–35 mm velké, papírovité, naspodu na žilkách pýřité, svrchu řídce pýřité v mládí, později oboustranně lysé, jen v úžlabí žilek hvězdovitě pýřité, 5–7 párů žilek končících v zubech, naspodu vyniklých, svrchu zapuštěných, báze klínovitá až široce klínovitá, okraj nad bázi ostře pilovitý, vrcholek špičatý, řapíky 1–3 cm;
Květenství	Listy eliptické nebo (kosočtverečně) obvejčité či vejčité, 30–100 × 10–35 mm velké, papírovité, naspodu na žilkách pýřité, svrchu řídce pýřité v mládí, později oboustranně lysé, jen v úžlabí žilek hvězdovitě pýřité, 5–7 párů žilek končících v zubech, naspodu vyniklých, svrchu zapuštěných, báze klínovitá až široce klínovitá, okraj nad bázi ostře pilovitý, vrcholek špičatý, řapíky 1–3 cm;

Květy	květy před listy, krásně a intenzívně vonné, listeny čárkovitě kopinaté, brvité, kališní trubka trubkovitě obkónická či trubkovitá, asi 2 mm, laloky vejčité, asi 0.5 mm, koruna v poupěti růžová, posléze bílá, řepicovitá, asi 1 cm v průměru, trubka 7–10 mm, laloky po 4–5, asi 4 × 3 mm, nitky velmi krátké nebo chybí, prašníky žlutobílé a téměř kulovité, blizny 3laločné
Plody	peckovice - červené, purpurově červenavé až posléze černé, podlouhlé, 8–10 × asi 6 mm velké

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	někdy i v XI–XII

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	špatně snáší horký a suchý úpal při letních vedrech
Faktor tepla	Zóna 5 (- 29 °C), nižší teploty způsobují vymrzání rostlin
Faktor vody	vyhovují jí vlhčí půdy, špatně snáší horký a suchý úpal při letních vedrech
Faktor půdy	pH mírně kyselé až neutrální, půdy vyžaduje živné
Faktor půdy - poznámka	vcelku dobře se jim daří i na půdách kyselých

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	řez nevyžaduje, starší jedince možno v předjaří hluboce zmladit
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době květu
Použití	okrasný keř - solitera, skupiny

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky
Množení - poznámka	nejčastější je množení řízkováním, za použití bylinných řízků

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
------------------------------	------