

Taxon Apium graveolens var. secalinum

Název taxonu	Apium graveolens var. secalinum
Vědecký název taxonu	Apium graveolens var. secalinum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.Alef.
Český název	celer naťový
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. secalinum
Nadřazená kategorie	Apium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středomoří
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro listy

Popisné a identifikační znaky

Habitus	v prvním roce vytváří růžici listů, ve druhem roce 1,2- 1,5m vysoká květní lodyha
Listy	aromatické větší, lichozpeřené řapíkaté
Květenství	složený okolík
Květy	drobné, bílé
Plody	žebnatá dvounažka
Semena	HTS 0,3-0,5g
Vytrvalost	dvouletý

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	sklizeň jednotlivých listů nebo celé rostliny
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	650 mm srážek v době vegetačního období
Faktor půdy	hluboké humózní půdy, hlinité, vododržné, záhřevné

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	srdéčkova hniloba celeru, virová mozaika celeru (Celery mosaic virus- CeMV), septoriová skvrnitost listů celeru (Septoria apiicola), Korkovitost bulv celeru (Phoma apiicola), háďatko severní (Meloidogyne hapla)
Doporučený spon pro výsad..	0,4 x 0,3 - 0,4 m

Množení

Množení	Předpěstování sadby
---------	---------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)