

Taxon Vitis vinifera Leanka

Název taxonu	Vitis vinifera Leanka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Leánka (Dívčí hrozen)’ (DH)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Feteasca Alba, Fehér Leányka, Mädhentraube, Fetjaska belaja
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patně maďarský, křížení není známo

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s výraznými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, široce otevřený; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitě-válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule kulatá, středně velká, žlutozelená; na vrcholu bobule je černá tečka po blizně
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Pesecká Leánka’ (má užší bazální výkroj)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší
Faktor vody suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy humóznější, písčitohlinité a hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož většinou SO 4, CR 2 i Kober 125 AA; na sušší stanoviště Kober 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití bílá mošťová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci střední odolnost k houbovým chorobám
Plodnost středně až pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína víno má výrazný charakteristický buket, je hořkomandlové vůně i chuti s vyšší kyselinkou
Doporučená technologie vína jakostní i přívlastková bílá vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

