

Taxon *Neoregelia carolinae*

Název taxonu	Neoregelia carolinae
Vědecký název taxonu	Neoregelia carolinae
Jména autorů, kteří taxon p...	(Beer) L.B. Sm. (1939)
Odrůda	‘Tricolor’
Český název	neoregelie Karolinina
Synonyma (zahradnický pou..	Aregelia carolinae (Beer) Mez; Bromelia carolinae Beer
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	fo. tricolor (M.B. Foster) M.B. Foster ex L.B. Sm.
Nadřazená kategorie	Neoregelia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše, Amazonská oblast a oblast Guyanské vysočiny
Biogeografické regiony - po..	Brazílie

Zařazení

Fytocenologický původ	pobřežní křoviny a tropické deštné lesy až do výšky 1600 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	epifitní, široce otevřená až plochá listová růžice s 10-12 listy; šířka 40-60 cm, výška 20-30 cm
Výhony	okolo mateřské rostliny se velmi rychle tvoří odnože s malými dceřinnými růžicemi
Listy	páskovité, 40-60 x 4-6 cm, středně zelené s měděným tónováním, rub načervenalý; u kultivaru ‘Tricolor’ listy zelené s krémovým středním pruhem, u báze červeno růžově skvrnitě; listy kulaté zakončené s otměným okrajem, výrazný ostěn na špičce listu; v době květu se vnitřní listy růžice zabarvují červeně a zdobí rostlinu po několik měsíců; po odkvětu listová růžice odumírá
Květenství	silně zkrácený hrozen na dně nálevky
Květy	trubkovité, až 4 cm dlouhé, trojčetné; okvětní plátky zašpičatělé, purpurově fialové až levandulově modré; květy podepřené červenými listeny

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	celoročně světlé, ne na plném slunci
Faktor tepla	teplý skleník; v létě 20-25 °C, v zimě by neměly klesnout pod 15 °C, krátkodobě poklesy k 10 °C
Faktor vody	celoročně vyrovnaná zálivka měkkou vodou o pokojové teplotě; zálivka rovněž dovnitř nálevky; vysoká vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní, hrubě vláknitý substrát z rašeliny, rašeliníku, bukového listí a vloček pěnového polystyrenu; pH 5,0 - 5,5
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	okenní vitríny a uzavřené zasklené prostory; v bytových podmínkách krátkodobá hrmkovka okrasná květem
Choroby a škůdci	puklice v příliš suchém vzduchu; zasychání listů v suchém vzduchu

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Množení oddělky
Množení - poznámka	výsevem ihned po sklizni při 27 °C

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/50079982?tab=references>