

Taxon Vitis vinifera Rulandske bile

Název taxonu	Vitis vinifera Rulandske bile
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Rulandské bílé’ (RB)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Pinot blanc, Burgundské bílé, Burgunder weiss, Roučí bílé
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	francouzská starobylá odrůda, jde o pupenovou mutaci v rámci skupiny "Pinot" (snad z Rulandského šedého)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	menší až středně velké, tupé
Listy	středně velké, tři až pětilaločnaté s mělkými horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený nebo překrytý; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule kulatá malá až středně velká, žlutozelená
Semena	středně velká, kulatá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Chardonnay’ (RB má úzce otevřený bazální výkrojek)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hluboké půdy, spraše, štěrkovitohlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží, půdy s vyšším obsahem vápníku příznivě podporují tvorbu aromatických látek

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož na chudších půdách Kober 5 BB nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci středně odolná k houbovým chorobám, láká obaleče
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Odrůdy klony PO-156/4, PO-158/7, PO-160/1, VP-155/6, VP-161/6, PE-177/5
Popis vína víno má svěží příjemnou kyselinu a aroma i chuť citrusových plodů, ořechu i medu
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková bílá vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

