

Taxon Billbergia x windii

Název taxonu	Billbergia x windii
Vědecký název taxonu	Billbergia x windii
Jména autorů, kteří taxon p...	Baker (1889)
Český název	bilbergie
Synonyma (zahradnicky pou..	Billbergia x windii hort. ex E. Morren
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	Billbergia decora X Billbergia nutans
Nadřazená kategorie	Bromeliaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	kříženec Billbergia decora Poepp. et Endl. a Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	epifytní bromélie s úzce trubkovitými růžicemi, dorůstající výšky 50 cm
Výhony	krátký oddenek; vytváří husté trsy
Listy	uspořádané do růžic s cca 10 listy; stálezelené jednoduché lineární až páskovitě, cca 70 cm dlouhé, s ozubenými okraji; středně zelené a pomoučené, na rubu s šedými proužky
Květenství	obloukovitě klenutá květenství, až 45 cm dlouhá; s jasně růžovými listeny
Květy	trubkovité, až 5 cm dlouhé; zelené s červeným lemem a purpurovými špičkami
Plody	bobule

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé až polostinné
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; v létě lze pěstovat venku; zimní teplota by neměla klesnout pod 12 °C
Faktor vody	v období vegetace udržovat vlhký substrát; vyšší vzdušná vlhkost; rosení měkkou vodou, sucho a suchý vzduch nepříznivě ovlivňuje kvetení
Faktor půdy	humózní substrát s trochou zahradní zeminy; pH 5,0 - 6,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden a prosinec
Použití	relativně nenáročná pokojová rostlina pro světlá a teplá stanoviště
Choroby a škůdci	štitěnky; kořenoví červci

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělků
Množení - poznámka	odnožemi, které se odebírají na jaře, při délce 10-15 cm

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://en.hortipedia.com/wiki/Billbergia_x_windii
--------	---

Grafické přílohy

