

Taxon Sambucus racemosa

Název taxonu	Sambucus racemosa
Vědecký název taxonu	Sambucus racemosa
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	bez červený, bez hroznatý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Viburnaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Malá Asie až severní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý vzpřímený keř 1,5-3 (4) m vysoký
Výhony	letorosty tenké, hladké, dřev světle hnědá
Pupeny	vstřícné
Listy	listy až 23 cm, lístky po 3-7, kopinaté, vejčité nebo oválné, téměř přisedlé, 4-12 cm, ostře a hrubě až jemně k bázi pilovité
Květenství	květy v hustých latách, 3-8 cm
Květy	květy žlutozelené
Plody	plody 4-5 mm tlusté, šarlatově červené

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast až V
Faktor vody	vlhké půdy
Faktor půdy	propustné, humózní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	IV-VI - květ, později plody
Použití	v krajině, zajímavé kultivary

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Roubování
Množení - poznámka	semenem množíme jen čistý druh, můžeme řízkovat, ale kultivary z řízků rostou jen obtížně, lépe je naroubovat na kořeny čistého druhu
Odrůdy	‘Laciniata’ - stříhanolistý, ‘Plumosa’ - list péřitý