

Taxon Rubus fruticosus agg.

Název taxonu	Rubus fruticosus agg.
Vědecký název taxonu	Rubus fruticosus agg..
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	ostružiník křovitý, ostružiník keřovitý, ostružiník obecný
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	celá Evropa, západní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř s dvouletými až víceletými pruty, které dřevnatějí a jsou obloučnaté, poléhavé nebo plazivé, někdy šplhají v křoví nebo v houštinách vzhůru mezi větvemi jiných stromů
Výhony	prýty oblé, častěji však trochu hranaté a obvykle porostlé tvrdými, špičatými, rovnými nebo zahnutými ostny a vedle nich ještě štětinovitými žlázkami
Pupeny	střídavé
Listy	listy na nekvetoucích prýtech jsou dlanitě nebo znoženě pětičetné, řidčeji jen 3 – 4četné, často ostnitě, složené z lístků široce vejčitých, špičatých, na okraji jednoduše nebo dvojité pilovitě zubatých, na líci lysých, chlupatých až šedobělavě plstnatých, listy kvetoucích prýtů jsou většinou 3 – 5četné
Květenství	lata, vyrůstající z paždí listů dvouletých prutů
Květy	kalich je obvykle plstnatý a korunní plátky (5) jsou bílé nebo růžové
Plody	složený plod se skládá jen z několika peckoviček, je lesklý, černý, neojíněný, jedlý

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-V, otužilý
Faktor vody	nenáročný
Faktor půdy	na půdu nenáročný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VIII - květ, pak plod
Použití	krajina, remízky, meliorační dřevina, zpevnění svahů, podrosty (někdy nežádoucí), plody chutné a listy se používají v léčitelství

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky, Hřížení a Množení šlahouny
Odrůdy	pod tento druh se v běžné praxi zahrnuje v Evropě několik stovek těžko rozlišitelných a občas se křížících druhů