

Taxon Potentilla fruticosa

Název taxonu	Potentilla fruticosa
Vědecký název taxonu	Potentilla fruticosa
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Jolina’
Český název	mochna křovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Potentilla

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	severní polokoule s výjimkou větší části východní Asie, v Evropě velmi řídce, spíše ostrůvkovitě

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímený, široce rozložitý keř 20-150 cm vysoký
Výhony	letorosty obvykle zprvu chlupaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy 3-7četné, jednotlivé lístky přisedlé, vejčité až podlouhle kopinaté nebo vejčitě kopinaté, 3-25 mm
Květy	květy 15-30 mm široké, po 1 až několika na vrcholcích větví, korunní lístky asi 8-15 mm, líc zlatožlutý, rub matně žlutý, tyčinek 12-25
Plody	nažky
Kůra a borka	kůra hnědočervená až hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světломilná
Faktor tepla	oblast I-III
Faktor vody	suchovzdorná
Faktor půdy	na půdu nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VIII - květ
Použití	dřevina pokryvná, do popředí keřových skupin

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky
Množení - poznámka	semenem můžeme množit základní druh, kultivary úspěšně množíme řízkováním (zelenými nebo polovyzrálými řízky)
Odrůdy	mnoho kultivarů různých velikostí a barvy květů