

Taxon Tatiana Kuřková: Heuchera villosa

Název taxonu	Heuchera villosa
Vědecký název taxonu	Heuchera villosa
Jména autorů, kteří taxon p...	Michx.
Český název	dlužicha
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Saxifragaceae
Vlastník kopie	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	Apalačské pohoří v nadmořské výšce cca 100-2000 m n. m.

Zařazení

Fytocenologický původ	Lesy, stinné okraje lesů na skalnatých stanovištích.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá trsnatě-výběžkatá bylina vzpřímeného růstu
Výhony	květonosné lodyhy vzpřímené, v přírodě 10-85 cm dlouhé, v pěstování většinou kolem 30-50 cm, dlouze žláznatě chlupaté.
Listy	dlouze řapíkaté, čepel okrouhle-srdčitá až podlouhlá, (5) 7-9 laločnatá, 3-26 cm se srdčitou bází; okraj čepele zubatý nebo pilovaný, laloky vejčité nebo trojúhelníkovité, na vrcholu špičaté nebo tupé, lysé nebo žláznatě chlupaté, rub listu naředlý.
Květenství	hustě nahloučená koncová lata na bezlistých lodyhách
Květy	kališní lístky zelené, na vrcholu zaokrouhlené, silně brvité, korunní lístky stočené, někdy zahnuté, čárkovité až obkopinaté, bílé, pouze 1-3 mm dlouhé, bílé.
Plody	tobolka - tmavě hnědá
Vytrvalost	vytrvalá, spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhká zahradní půda. Velmi dobře toleruje sucho.
Faktor půdy	živná, zahradní humózní půda
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné nároky na pH půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	podrosty jak tradičního záhonového tak přírodě blízkého charakteru, půdní pokryvy menších ploch; vhodná ke kombinacím s jinými trvalkami podobných nároků; květenství uplatnitelné ve floristice jako neutrální komponent
Použití	stinné části záhonů; při použití s vodou nemůže být v zamokřené půdě,
Růstové i jiné druhově spec..	pomalé rozrůstání oddenky do okolí,
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů a Množení odkopky
Odrůdy	‘Chantilly’ - květenství hustší a mohutnější než u základního druhu; var. macrorrhiza - robustný list i květenství,

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 6: záhon vlevo od schodiště k budově D / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)

Ostatní

Odkazy

- http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=242416654

Grafické přílohy

