

Taxon Vitis vinifera Malverina

Název taxonu	Vitis vinifera Malverina
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Malverina’ (Ma)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	BV-19-143
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Rakiš’ (Villard blanc x Veltlínské červené rané) x ‘Merlan’ (Merlot x Seibel 13 666)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světlejší, šedohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, slabě pětilaločnaté s mírnými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, lehce překrytý; povrch listu je světle zelený, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá, malá až středně velká, zelenožlutá na osluněné straně červenošedá
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Savilon’, popř. ‘Vesna’ (Ma má žluzelené bobule s růžovošedým

	líčkem)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité a naopak i suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	do hlubších humóznějších půd SO 4, CR 2 a Kober 125 AA, do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože LE-K/1 i Kober 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	vysoká odolnost k houbovým chorobám, je napadána roztoči
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	vůně vína je ovocná, jemně kořenitá; chuť je kořenitá po vanilce a skořici, s příjemnou hořčinkou v dochuti
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, sur-lie, barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 92, 16\)](#)

Grafické přílohy



