

# Taxon Hippophae rhamnoides

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Hippophae rhamnoides                     |
| Vědecký název taxonu           | Hippophae rhamnoides                     |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                       |
| Český název                    | rakytník úzkolistý, rakytník řešetlakový |
| Autor                          | Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)  |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                     |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Hippophae</a>                |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Evropa (Skandinávie, Alpy, Apeniny), Asie od Turecka přes Kavkaz až po Čínu                             |

## Zařazení

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | keř až strom                                  |
| Životní forma                 | Fanerofyt                                     |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | opadavý, trnitý a hustě větvený keř až strom, výška 1-6 m                                                                    |
| Výhony           | větve hladké, trnité, letorosty stříbřitě šupinaté                                                                           |
| Pupeny           | střídavé                                                                                                                     |
| Listy            | listy úzce kopinaté až podlouhle vejčité, 4-8 cm, líc šedozelený, stříbřitě lesklý, rub hnědavě až stříbřitě plstnatý, matný |
| Květy            | květy před listy, samčí přisedlé v úžlabních svazečcích, samičí stopkaté ve svazečcích po 2-5                                |
| Opylovací poměry | Cizosprašná                                                                                                                  |
| Plody            | plody elipsoidní až téměř kulovité, 6-8 mm                                                                                   |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Březen |
| Konec doby kvetení   | Duben  |

## Nároky na stanoviště

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓           |
| Faktor světla - poznámka | světlomilná |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Faktor tepla | oblast I-II, namrzá               |
| Faktor vody  | suchovzdorná                      |
| Faktor půdy  | na půdu nenáročná, snese zasolení |

## **Užitné vlastnosti**

---

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | celá vegetace - listy, podzim - plody                                                           |
| Použití                        | nápadná solitéra, meliorační dřevina, pěstována jako ovocná dřevina pro vysoký obsah C vitamínu |

## **Množení**

---

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Předpěstování sadby                                                                                         |
| Množení - poznámka | na některých stanovištích hojně výmladků - lze množit i jimi, např. pokud potřebujeme znát pohlaví rostliny |