

Taxon Echinops ritro

Název taxonu	Echinops ritro
Vědecký název taxonu	Echinops ritro
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	bělom modrý
Synonyma (zahradnický pou..	Echinops tauricus
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Echinops

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Středozeří, Španělsko, Francie

Zařazení

Fytocenologický původ	výslunné kamenité a skalnaté stráně, trávnický na okrajích vinic nebo komunikací, zejména na vápencovém podkladě, v pásnu od mořského pobřeží po 1500 m n. m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí trsy, v zahradnické praxi dosahující výšky 80 - 120 cm,
Kořen	větvený, větvenovitý až kulovitý kořen - špatné přesazování
Výhony	přímé, řídce větvené, oblé, drsně chlupaté, stříbřité
Listy	přízemní dlouze řapíkaté, vytvářející listovou růžici, peřenosečné nebo peřenoklané. Lodyžní v obrysu kopinaté, střídavé, 10 - 20 cm dlouhé, jednou až dvakrát peřenoklané v ostnitě úkrojky, na rubu běloplstnaté
Květenství	strbouly (někdy označované jako hlávky) 4 - 8 cm v průměru
Květy	jednokvěté úbory dlouhé asi 2 cm, modré barvy. Trubkovitá koruna oboupohlavných květů je složena z pěti srostlých, modrých plátků
Plody	souplodí nažek.
Možnost záměny taxonu (+..	těžko rozlišitelná od E. banaticus; na území ČR jako invazivní druh se šíří E. sphaerocephalus se špinavě bílými úbory
Vytvalost	spolehlivě mrazuvzdorná

Dlouhověkost	středněvěká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplomilná trvalka
Faktor vody	suchomilná
Faktor půdy	na půdu nenáročná, vyžaduje půdy propustné, teplé,
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití	nenáročný taxon se zajímavou strukturou
Růstové i jiné druhově spec..	trvalky medonosná, komerčně pěstovaná k řezu, také k sušení
Doporučený spon pro výsad..	3 - 5 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní a Množení oddělky
Odrůdy	'Veitch's Blue' - intenzivněji vybarvená než původní druh

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2006
------------------------------	------

Grafické přílohy

