

Taxon Vitis labrusca Ananasnyj

Název taxonu	Vitis labrusca Ananasnyj
Vědecký název taxonu	Vitis labrusca
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Ananasnyj rannyy´ (Ans)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Ananasny, Ananasovyj
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původně vznikla ve Francii nebo Belgii, její pravděpodobní rodiče jsou ´Chasselas Dore´ (Chrupka bílá) x ´Isabella´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má bujný až velmi bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, žlutavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	velmi velké, trojlaločnaté s mírnými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, většinou otevřený; povrch listu je vrásčitý, vespod silně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velmi velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je velmi velká, mírně oválná, žlutozelené barvy
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažen
Podnoží na chudších půdách Kober 125 AA , do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda - přímý konzum i burčák
Choroby a škůdci středně odolná k houbovým chorobám, citlivá k plísni révové
Plodnost středně pozdní až pozdní, pravidelná (výnos 5-7 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je rozplývavá, při přezrávání sliznatá, v chuti výrazně ananasová

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 129\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

