

Taxon *Myrtus communis*

Název taxonu	Myrtus communis
Vědecký název taxonu	Myrtus communis
Jména autorů, kteří taxon p...	L. (1753)
Český název	myrta obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Myrtus oerstediana O. Berg; Myrtus sparsifolia O. Berg
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Myrtus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Makaronézska oblast, Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa: Iberský poloostrov, Francie, Apeninský poloostrov, Balkánský poloostrov, Turecko, střední Východ, Irán, střední Asie, Pákistán, severozápadní Afrika, Lybie

Zařazení

Fytocenologický původ	výskyt na slunných a skalnatých svazích, pastvinách, lesních okrajích; součást křovinatých formací středomořské vegetace
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem, Listnatý keř stálezelený a Léčivá rostlina
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	hustě rozvětvený stálezelný keř výšky 1-3(-5) m
Výhony	vstřícně postavené; 4hranné a metlovité; v mládí žlaznatě pýřité
Listy	vstřícné a křížmostojné; vejčité, vejčitě kopinaté až kopinaté, zelené, kožovité, po rozemnutí aromatické, 2,5–5 x 1 cm dlouhé, celokrajné, rub matně zelený
Květy	jednotlivé a úžlabní; na dlouhých stopkách, 2–3 cm v průměru; bílé až růžovobílé, okvětní plátky okrouhle vejčité; vonné
Plody	bobule černé nebo modročerné; téměř kulovité asi 7–12 mm dlouhé, stopkaté

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce až polostín; letnění
Faktor tepla	studený skleník či interiér; zimní teploty 4-12 °C
Faktor vody	půda rovnoměrně vlhká
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí zahradní zeminy; pH 5,0 - 6,0

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	tvarovací řez po odkvětu
-----	--------------------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	hrnková rostlina okrasná habitem; tvarované rostliny a pokojové bonsaje; rostlina pro svatební floristiku
Choroby a škůdci	puklice v teplém prostředí

Množení

Množení	Vegetativní, Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka	nejlépe vylamované řízky s patkou (VII)
Odrůdy	Albocarpa' - plody bílé; 'Buxifolia' - listy široce eliptické; 'Compacta' - habitus zakrslý, hustý; 'Flore Pleno' - květy plné, bílé; 'Leucocarpa' - plody bílé; 'Microphylla Variegata' - listy bíle panašované; 'Microphylla' - habitus zakrslý, rostliny jsou hustě olistěné, výhony hnědé, listy kratší než 25 mm, čárkovitě kopinaté; 'Minima', vzrůst zakrslý, listy malé; 'Variegata' - středně velké, hustě větvené keře se širokým habitem; listy vejčité až vejčitě kopinaté, lesklé a tmavé s panašováním; var. acutifolia - vzrůst vzpřímený, výhony červenavé; listy kopinaté, zašpičatělé, báze klínovitá, 2.5–4 cm dlouhé; var. italica, větve a výhony strmule vzpřímené; listy okrouhle kopinaté, asi 3 cm dlouhé; var. latifolia, listy podlouhle vejčité až podlouhle kopinaté, špičaté, 1.8–3 cm dlouhé; var. romana - listy široce vejčité, ostře špičaté, světle zelené, 3–4.5 cm dlouhé, často v přeslenech po 3–4; ssp. tarentina - větve krátké, letorosty a stopky listů hustě chlupaté, listy křížmostojné, ve 4 řadách, úzce vejčité

Celky sbírek

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/22102175?tab=references>
- <http://www.tropicos.org/Name/22102175?tab=chromosomecounts>

Grafické přílohy

