

Taxon *Miscanthus sinensis* 'Zebrinus'

Název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'
Vědecký název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Andersson
Odrůda	'Zebrinus'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonsko až Kurilské ostrovy; kultivar v pěstování více než 100 let

Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva s krátkými oddenky; kompaktní sloupovitý růst. Trs pravidelný, kompaktní, v horní části s převísajícími listy. V listu vysoký přibližně 160 - 180 cm, kvete zřídka; středně vysoký kultivar
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu <i>Miscanthus</i>)
Výhony	vzpřímené olistěné stébla někdy ukončené kvetenstvím
Listy	listy v přizemních trsech a na lodyhách, široké s výrazným příčným žlutým žíháním. Přibližně od poloviny své délky obloukovitě převísající; širokolistý kultivar
Květenství	květní laty hnědo červené, poté stříbřitě hnědé těsně nad listy
Květy	klásek s osinou
Možnost záměny taxonu (+..	podobný jako 'Strictus' od kterého se liší méně nastrčeným, převislým, měkčím listem. Také podobný jako Punktchen od

kterého se liší výraznějším, intenzivnějším žláháním, také méně strnulým růstem, širším a delším listem a pouze ojedinělým kvetením. Půntchen kvete již od konce srpna.

Vytrvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Říjen
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	K vykvétání potřebuje dlouhý a teplý podzim; kvete zřídka.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; mírný polostín toleruje. Při nedostatku světla se vytahuje, ztrácí příčné pruhy.
Faktor tepla	mrazuvzdorný ale choulostivější než podobný Punkchten nebo Strictus
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; mírné sucho toleruje.
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od června do jara dalšího roku. Listy drží barevnost až do zimy.
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	listy možno použít k řezu v čerstvém stavu
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů tvoří zajímavé struktury i v zimě a nehrozí vyhnívání trsů.
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
---------	--

Množení - poznámka

dělením na jaře (duben) před rašením

Odrůdy

na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [C 3: záhon za vnitroblokem bud. C a kolem... / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2002

Grafické přílohy

