

Taxon Androsace studiosorum

Název taxonu	Androsace studiosorum
Vědecký název taxonu	Androsace studiosorum
Jména autorů, kteří taxon p...	Kress (1982)
Český název	pochybek prvosenkovitý
Synonyma (zahradnický pou..	Androsace primuloides Duby
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Androsace

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	západohimálajské horské masívy (Kumaon, Ladakh, Chamba, Nepal)

Zařazení

Fytocenologický původ	oreofyt / etalofyt, nomofyt - subalpinské křoviny a travnaté svahy mezi 2800 - 4200 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trvalka s výběžkatými, přezimujícími, dimorfními listovými růžicemi, za květu do 0.1 m vysoká
Kořen	adventivní kořeny ze zkrácených oddenků
Výhony	hnědočervené stolony s dceřnými růžicemi
Listy	dimorfní: přezimující drobné, obvejčité a hustě bělavě vlnatě chlupaté, jarní větší, elipčité kopinaté, bělavě pýřité
Květenství	okolíky až dvacetikvěté, pýřité a žláznatě chlupaté
Květy	aktinomorfní, různobalné, srostloplátečné, pětičetné s krátkými trubkami, sytě růžové, haplostemonické, homostylické
Plody	okrouhlé dvou- nebo třísemené tobolky otvírané apikálními zuby (bez okrasné hodnoty)
Semena	hrnatě vejčitá, hnědá
Možnost záměny taxonu (+..	často zaměňována s velmi podobnou Androsace sarmentosa Wall. (jarní listy olysávající, odění hnědavé); ostatní pěstované druhy sekce Chamaejasme jsou drobnější a s monomorfními listovými růžicemi

Dlouhověkost	nepříliš dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -28°C (USDA)
Faktor vody	mesofyt
Faktor půdy	organickými složkami bohaté, nezasolené půdy s pH 6.2-7.8
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	A2 so-abs; doplňkově St2 abs, FR2 so-abs (svěží půdy na slunci)
Choroby a škůdci	rzi (Puccinia) a ascomycety (Rhizoctonia, Cercospora), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Aulacorthum, Aphis) a molice (Trialeurodes)
Doporučený spon pro výsad..	20-30 rostlin na m2

Množení

Množení	Dělení trsů a Množení šlahouny
Konečné hrnky	6-8 cm
Retardace	ne
Květní tvorba	exaktní data dosud málo známa, nutná je vernalizace
Odrůdy	lososově růžová 'Salmon' a bělokvětá 'Doksa' - nabízeny jen ojediněle

Ostatní

Odkazy	Kress, A.: Eine "neue" Androsace-Art: Androsace studiosorum Kress, spec. nov. (Androsace primuloides). Phytologia 52 (1982) 255-256.
--------	--



