

Taxon Berberis thunbergii ‘Golden Ring’

Název taxonu	Berberis thunbergii ‘Golden Ring’
Vědecký název taxonu	Berberis thunbergii
Jména autorů, kteří taxon p...	DC.
Odrůda	‘Golden Ring’
Český název	dříšťál Thunbergův
Synonyma (zahradnický pou..	Berberis japonica, Berberis sinensis
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. atropurpurea
Nadřazená kategorie	Berberis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: Royal Nurseries P. Lombarts, Zundert, Holandsko, 1950

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 1 m, vzrůst hustý a okrouhlý
Výhony	letorosty hranaté a s červenohnědé, s trny jednoduchými až 3dílnými, 5–15 mm
Pupeny	střídavé
Listy	řapíky 2–8 mm nebo téměř chybí, listy velké, sytě červené až tmavočervené a úzce jasně žlutě až zelenavě žlutě lemované, čepel obvejčitá, kopistovitá nebo kosočtverečně vejčitá, někdy vejčitá, na podzim šarlatově červená a oranžová, 5–35 × 3–22 mm velká, papírovitá, oboustranně lysá, báze protažená, klínovitá, okraj plochý, celokrajný, vrcholek tupý nebo zaoblený, někdy hroditý
Květenství	po 1 - 5 v okolíčnatých květenstvích
Květy	stopky květů 5–10 mm, sepaly ve 2 kruzích, vnější červenavé a vejčitě eliptické, 4–4.5 × 2.5–3 mm velké, vnitřní široce eliptické, 5–6 × 3.3–3.7 mm velké, petaly podlouhle obvejčité, 5.5–6 × 3–4 mm
Plody	plody jasně či šarlatově červené, elipsoidní nebo kulovité a 7–10 ×

	4 mm velké
Semena	1 - 2 na plod
Kůra a borka	červenohnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světломilný
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světломilný, ve stínu se listy nevybarvují
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 4 (do - 34°C)
Faktor vody	nemají rádi přemokřené půdy
Faktor půdy	neutrální, snesou i suché, kamenité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	dle použití
-----	-------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezona
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, živé ploty
Choroby a škůdci	Přeslenatka obecná, Bakteriální skvrnitost listů a výhonů, Pilatěnka dřšťálová

Množení

Množení	Přímý výsev, Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka	Generativní množení je možné, ale potomstvo je variabilní, v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary druhu Berberis thunbergii množení řízkováním

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Poznámka matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)