

# Taxon Tradescantia zebrina

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Název taxonu                   | Tradescantia zebrina           |
| Vědecký název taxonu           | Tradescantia zebrina           |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Hort.ex Bosse</a>  |
| Odrůda                         | ‘Mme Lequesne’                 |
| Český název                    | podénka pruhovaná              |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Zebrina pendula Schniz.        |
| Autor                          | Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>         |
| Vnitrodruhové jednotky         | var. zebrina                   |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Tradescantia</a>   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Neotropická květenná říše a Karibská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Střední Amerika: z Chiapas po Kostariku     |

## Zařazení

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | helorgadofyt, petrochtofyt - vlhké lesy a mokravé skály od pobřeží k 1800 m n.m., často zplaňuje na druhotných stanovištích |
| Pěstitelská skupina           | Interiérová rostlina okrasná listem                                                                                         |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | poléhavá kobercovka (zimní zahrady, sesazované nádoby) nebo přepadavá hmkovka pro závěsné košíky, zelené stěny atd.         |
| Životní forma                 | Chamaefyt                                                                                                                   |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | plazivá (0.2 m) nebo přepadavá bylina                                                                                                                                                      |
| Kořen                      | adventivní zpod nodů                                                                                                                                                                       |
| Výhony                     | poléhavé, větvené, purpurové, zelenavě skvrnkaté                                                                                                                                           |
| Listy                      | střídavé, temně zelené, vespod purpurové, hrotnatě vejčité, lysé s podélnými stříbřitými pruhy (var. zebrina), pýřité (var. purpusii, var. mollipila) až vlnatě chlupaté (var. flocculosa) |
| Květenství                 | dvoustranně srůstavé vijany v člunkovitě sevřených listenech                                                                                                                               |
| Květy                      | oboupohlavné, aktinomorfní, různobalné, volnoplátéčné, trojčetné, purpurově růžové, diplostemonické                                                                                        |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                                                                |
| Plody                      | tobolky                                                                                                                                                                                    |
| Semena                     | elipčitá s postranními zárodky                                                                                                                                                             |
| Možnost záměny taxonu (+.. | díky značné proměnlivosti (především u pýřitých variet)                                                                                                                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | zaměnitelná s řadou jiných podének nebo (nekvetoucích) s druhu typové sekce rodu Gibasis: běžně pěstované - s výjimkou <i>Tradescantia cerinthoides</i> Kunth (listy masité, shora lysé a vespod pýřité) a <i>Tradescantia sillamontana</i> Matuda (protohemikryptofyt, masité silně vlnaté listy) - kvetou však bíle |
| Dlouhověkost | relativně krátkověká - rychle stárne, nutno zmlazovat                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Doba kvetení

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Začátek doby kvetení    | Listopad                      |
| Konec doby kvetení      | Duben                         |
| Doba kvetení - poznámka | příležitostně kvete celoročně |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                |
| Faktor světla - poznámka | přizpůsobivá, ale kompaktní jen za dobrého osvětlení (40-60 klux)                |
| Faktor tepla             | přizpůsobivá teplotám od 4°C do 30°C; produkce 18°C-20°C množení, poté 16°C/12°C |
| Faktor vody              | vlhkomilná, ale značně přizpůsobivá                                              |
| Faktor půdy              | přizpůsobivá; produkce zpravidla v bažinaté rašelině s pH 6.0-7.0                |

## Užité vlastnosti

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choroby a škůdci            | rizi ( <i>Uromyces</i> , <i>Phakopsora</i> ) a početné deuteromycety ( <i>Colletotrichum</i> , <i>Septoria</i> , <i>Alternaria</i> , <i>Cercospora</i> ); ze škůdců klopušky ( <i>Pycnoderes</i> ), některé mandelinky ( <i>Lema</i> , <i>Neolema</i> ), motýli rodu <i>Mouralia</i> a mšice ( <i>Myzus</i> , <i>Rhopalosiphum</i> ), v neposlední řadě háďátka rodů <i>Meloidogyne</i> a <i>Aphelenchoides</i> |
| Doporučený spon pro výsad.. | v zimních zahradách 4-6 rostlin na m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Množení

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení        | Řízkování a Vrcholové řízky                                                                                                                                       |
| Konečné hrnky  | 10 cm hrnky (8-10 řízků) - 80-90 hrnků na m <sup>2</sup> , po čtyřech týdnech rozestavení 40-50 hrnků na m <sup>2</sup> ; také 18 cm závěsné košíky (15-25 řízků) |
| Retardace      | chlormequat 0.2% pro sytější vybarvení a kompaktní olistění                                                                                                       |
| Doba kultivace | v 10 cm hrnkách asi osm týdnů, v 18 cm koších až 14 týdnů                                                                                                         |
| Odrůdy         | asi půl tuctu odrůd lišících se především listovou variegací                                                                                                      |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

## Ostatní

---

VBN statistiky    Tradescantia 2010: 430 000 prod.rostlin s prům.cenou 1.48 Euro, pozice 139. mezi hrnkovými květinami; Nejprodávanejší odrůdy (T. zebrina): 'Shiny Hill', 'Violet Hill'

### Odkazy

- Hunt D.R. (1986 Z): Campelia, Rhoeo and Zebrina united with Tradescantia. American Commelinaceae: XIV. Kew Bulletin 41 (2): 401-405; Stahn B., Kühn J., Kaufmann H.G. (1987): Grünpflanzen in Tabellen und Übersichten. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berl

## Grafické přílohy

---





