

Taxon Salix repens

Název taxonu	Salix repens
Vědecký název taxonu	Salix repens
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	vrba plazivá
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Salix

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	západní Evropa až východní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nízký, široce rozložitý keř, větve poléhavě vystoupavé, výška 30-100 (200) cm
Pupeny	střídavé
Listy	listy štíhle kopinaté, eliptické, úzce elipticky vejčité nebo podlouhlé, až 5 cm, ve středu nejširší, celokrajné, svrchu sytě zelené a lesklé, rub hedvábně chloupkatý
Květenství	jehnědy vzpřímené, vejčité, obvejčité nebo krátce cylindrické, 1-3 cm, samčí obvykle delší než samičí, prašníky žluté
Plody	tobolky

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	kvete těsně před rašením listů

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	oblast I-V

Faktor vody	vlhko
Faktor půdy	chudé půdy, nížinná i horská rašeliniště

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VIV-V - jehnědy
Použití	krajina

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka	rozmnožování semenem se téměř neprovádí, nejčastější je množení dřevitými