

Taxon *Foeniculum vulgare* var. *azoricum*

Název taxonu	<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>azoricum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>azoricum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Mill., Mill., Thell.
Český název	fenykl sladký
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	ssp. <i>vulgare</i> var <i>azoricum</i>
Nadřazená kategorie	Foeniculum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Itálie
-------------------------------	--------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Listová a stonková zelenina
---------------------	--

Popisné a identifikační znaky

Habitus	růžice nitkovitě dělených listů, tvořící nepravou cibuli z dužnatých listových pochev, výrazně rýhovaných
Kořen	mohutný kulový kořen
Listy	nitkově dělené listy, řapíky podlouhlé, trojúhelníkovité, až 200 mm dlouhé, na bázi silně zdužnatělé, čepel je 250 mm dlouhá, 70 - 150 mm široká, 3 - 4x peřenosečná, tvořená čárkovitými až niťovitými listy, které jsou všestranně rozložené
Květenství	za dlouhého dne se vytváří květní stvol nesoucí okoličnaté květenství
Květy	malé žluté květy
Plody	žebnaté dvounažky
Semena	zelenohnědé, aromatické
Vytrvalost	jednoleté

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	méně náročný na teplotu, optimum kolem 18 °C, teploty po 7 a nad 24 °C brzdí růst, klíčení 20 - 22 °C, pro předpěstování sadby 15 - 20 °C, nízké teploty podporují vybíhání do květu
Faktor vody	dobře zásobené vodou, při nedostatku jsou konzumní části tvrdší, málo šťavnaté

Faktor půdy	hlubší humózní půdy, řepařská oblast
Faktor půdy - poznámka	vhodnější chráněné teplejší polohy

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Doporučený spon pro výsad..	0,4 - 0,5 x 0,2 - 0,3 m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)