

Taxon Vitis vinifera Carmenere

Název taxonu	Vitis vinifera Carmenere
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Carmenére’ (Ca)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Grande Vidure, Grand Carmenet, Cabermella
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starší francouzská odrůda, vznikla spontánním křížením odrůd ‘Gros Cabernet’ x ‘Cabernet Franc’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnatý se středními výkroji, bazální výkroj je většinou úzce otevřený; povrch listu je vrásčitý, tmavě zelený, spodní strana listu je jemně plstnatá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, hustší, kuželovitý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, tmavě modrá
Semena	středně velká, hruškovitá , s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červen

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody snáší i sušší a kamenité půdy

Faktor půdy hlinité, hlinitopísčité půdy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení

Řez na dlouhý tažeň

Podnož do sušších a vápenějších půd CR 2 či Kober 125 AA, pro úrodné půdy SO 4 či T 5C

Užitné vlastnosti

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína

Choroby a škůdci nižší odolnost k houbovým chorobám, citlivá zejména na plíseň réвовou

Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 8 - 12 t/ha)

Množení

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací

Popis vína víno má tmavě červenou barvu a specifickou odrůdovou chuť podobnou odrůdě Merlot

Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, kupáže, barrique

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 93, 94\)](#)

Grafické přílohy

