

# Taxon Dryas x sündermannii

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Dryas x sündermannii                   |
| Vědecký název taxonu           | Dryas x sündermannii                   |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Kellerer ex Sündermann</a> |
| Český název                    | dryádka Sündermannova                  |
| Autor                          | Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)         |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                   |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Rosaceae</a>               |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holartická květenná říše a oblast Skalistých hor (severozápad SA)                                                                                                                                  |
| Biogeografické regiony - po.. | zahradní hybrid - uvedený fytochorion odpovídá místům společného výskytu rodičovských taxonů (D. octopetala L. s rozšířením boreálně cirkumpolárním, a severoamerická D. drummondii Rich.ex Hook.) |

## Zařazení

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | coryphofyt, crymofyt - alpské a arktické kamenité pláně, v asijských horách k 2800 m.n.m. (D. octopetala); petrochtofyt (D. drummondii) |
| Pěstitelská skupina           | Trvalka stálezelená a Keřiček stálezelený                                                                                               |
| Životní forma                 | Chamaefyt                                                                                                                               |
| Zařazení podle původu, nár... | Di - divoce rostoucí trvalka                                                                                                            |
| Zařazení podle původu, nár... | skalky a podobné kamenité partie                                                                                                        |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | plazivě polštářovitá dřevina (za květu do 0.1 m výšky)                                                                                                              |
| Kořen            | adventivní                                                                                                                                                          |
| Výhony           | poléhavé, rychle dřevnatějící, bohatě větvené, hustě olistěné                                                                                                       |
| Listy            | střídavé, kožovité, elipčité s hrubě pilovitými okraji, řapíkaté s šídlovitými palisty, shora leskle zelené a téměř lysé, vespod běloplstnaté s vyniklou nervaturou |
| Květenství       | solitérní květy na pltnatých a žláznatých stopkách z paždí listů                                                                                                    |
| Květy            | pravidelné, zvonkovitě osmiplátéčné s mnoha tyčinkami a pestíky, krémově bílé se žlutými prašníky, s purpurově žláznatými kalichy, často mírně skloněné             |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                                         |
| Plody            | nažky s přetrvávajícími chlupatými nažkami                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semena                     | vysévají se celé chmýru zbavené nažky                                                                                                                                                                            |
| Možnost záměny taxonu (+.. | v zahradách často chybně vydávána za <i>Dryas octopetala</i> L. (extrémně variabilní v řadě subspecií, obecně však útlejší a s květy na kratších stopkách miskovitými); s druhým z rodičů záměna nepravděpodobná |
| Dlouhověkost               | dlouhověká                                                                                                                                                                                                       |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                                 |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                                 |
| Faktor světla - poznámka | heliofyt, v polostínu málo kvete                                                                  |
| Faktor tepla             | mrazuvzdorná do -40°C (USDA)                                                                      |
| Faktor vody              | mesofyt                                                                                           |
| Faktor půdy              | propustná, dobře drenážovaná, ale nevysychavá, pH 6.5-8.0                                         |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                                                                 |
| Faktor půdy - poznámka   | přízpůsobivý taxon, upřednostňuje však chudší zásadité půdy, nepříliš vysychavé a dobře propustné |

## Užitné vlastnosti

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití - pro trvalky           | VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum                                                                                                                                                                                                                     |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | nepostradatelná především ve skalkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Choroby a škůdci                | početné askomycety: <i>Septoria</i> , <i>Sphaerotheca</i> , <i>Hypoderma</i> , <i>Brunnipila</i> , <i>Mycosphaerella</i> , <i>Lophiostoma</i> , <i>Patinella</i> , <i>Phacosphaeria</i> , <i>Crocicreas</i> , <i>Ottia</i> , <i>Isothea</i> , <i>Gibbera</i> , <i>Grahamiella</i> , <i>Leptosphaerulina</i> , <i>Pleospora</i> , <i>Wettsteinia</i> a další; ze škůdců štítenky ( <i>Heliooccus</i> , <i>Chorizococcus</i> ), mšice ( <i>Acyrtosiphon</i> ), háďátka ( <i>Stictylus</i> ) atd. |
| Doporučený spon pro výsad..     | 8-12 rostlin na m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Množení

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Množení            | Řízkování a Vrcholové řízky                              |
| Množení - poznámka | stimulované odtržky s patkou zdlouhavě koření, nejlépe z |

|                |                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | březnového množení - nutno počítat s výpadky; osivo klíčí hned po sběru nebo až po stratifikaci, vzešlé rostliny hrnkování schopné zjara příštího roku |
| Konečné hrnky  | 10-12 cm                                                                                                                                               |
| Retardace      | ne                                                                                                                                                     |
| Květní tvorba  | dosud neověřována, nezbytná je vernalizace, exaktní data nedostupná                                                                                    |
| Reakční doba   | dosud neověřována, exaktní data nedostupná                                                                                                             |
| Doba kultivace | kvetoucí rostliny z výsevu 22-30 měsíců, z pozdně letního řízkování asi osm měsíců (spojeno však s největšími výpadky)                                 |
| Odrůdy         | z přesevů se občas vyštěpí žlutě kvetoucí rostliny                                                                                                     |

## Ostatní

---

### Odkazy

- Porsild A.E. (1947): The genus *Dryas* in North America. The Canadian Field-Naturalist 61 (6):175-192. Walter V. (1978): Rozmnožování okrasných stromů a keřů. SZN, Praha; McGraw J.B., Antonovics J. (1983): Experimental ecology of *Dryas octopetala* ecotypes
- UHER, J. Dryádky a jejich uplatnění. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 9, s. 28--30. ISSN 1213-7596.

## Grafické přílohy

---





