

Taxon Vitis vinifera Medina

Název taxonu	Vitis vinifera Medina
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Medina’ (Med)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Medea, Egri csillagok 7, Ecs - 7
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o maďarskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘SV 12 286’ x ‘Merlot’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je červenohnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, pětilaločnaté, s mírnými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je světle zelený, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitě válcovitý hrozen, středně hustý až řidší; bobule je středně velká, kulatá, modročerná
Semena	menší, hruškovitá, zobáček je krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Cerason (Laurot má malé bobule)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	nevadí i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	doporučovány jsou podnože SO 4, CR 2 a Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	odolná k houbovým chorobám
Plodnost	středně pozdní, vyšší a pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno je rubínově červené, s jemnými tříslovinami, chuti ovocné, připomínající brusinky až ostružiny
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 103)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

