

Taxon Abutilon x hybridum

Název taxonu	Abutilon x hybridum
Vědecký název taxonu	Abutilon x hybridum
Jména autorů, kteří taxon p...	hort. ex Voss (1894)
Český název	mračňák zvrhlý; podslunečník; "pokojový javor"
Synonyma (zahradnicky pou..	Abutilon globosum hort.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Abutilon

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	kulturní rostlina; rodičovské druhy pocházejí z Brazílie; zdomácňuje v tropických oblastech světa; A. darwinii Hook. f. x A. pictum (Gillies ex Hook. et Arn.) Walp.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá, Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř, výška 150 - 200 cm
Výhony	jemně pýřité, starší výhony dřevnatějící
Listy	střídavé a stopkaté; dlanitě laločnaté nebo podlouhlé, 0–5laločné, na okraji pilované; tmavě zelené, případně s panašováním (žluté nebo bílé); měkké a jemně pýřité; neopadavé
Květy	jednotlivě v úžlabí listů; květy zvonkovité do 5 cm délky; pětičetné (5 sepal, 5 petal); dlouze stopkaté, převisající; barvy: bílá, žlutá, růžová, červená, lososově červená, oranžová
Semena	ledvinitá
Možnost záměny taxonu (+..	jeden z rodičů A. pictum (Gillies ex Hook. et Arn.) Walp. - čepel listů výrazně dlanitě 3–7laločná nebo dílná, 4–15 cm velká, laloky vejčitě protáhlé, okraj pilovitý nebo zubatý či vroubkovaný; květy jednotlivě, dlouze stopkaté (7–10 cm), zvonkovité, nící, žluté až oranžové s karmínovými žilkami

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	při vhodných podmínkách může kvést i celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; v letních měsících ochrana před přímým slunečním zářením
Faktor tepla	přezimování ve studeném až poloteplém skleníku či interiéru; optimální teplota v zimě 10-15 °C, snese poklesy až k 5 °C.
Faktor vody	během vegetace vydatná zálivka, nutno zabránit přemokření kořenového balu; v zimě zálivka omezená, zejména při nižších teplotách (okolo 5-10 °C)
Faktor půdy	středně těžký, humózní substrát s podílem rašeliny a zahradní půdy; pH 6,0-7,0
Faktor půdy - poznámka	každoroční přesazování v předjaří, pravidelné přihnojování 1x za dva týdny

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	velmi dobře snáší; po přesazení vyžaduje hluboký zpětný řez, téměř o polovinu délky výhonů
-----	--

Užitné vlastnosti

Použití	atraktivní nádobová rostlina pro světlé a chladnější zimní zahrady; letnění (terasy, balkóny a zahrady) na chráněných stanovištích před větrem a deštěm; výsadba do letničkových záhonů; kvetoucí malé rostliny jako krátkodobá dekorace interiéru
Choroby a škůdci	listové mšice, svilušky a puklice; v průvanu a při změně stanoviště opadávají květy; při příliš chladném přezimování opadávají listy

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Vrcholové řízky a Osní řízky
Odrůdy	dle barvy květů: bílá (´Boule de Neige´, ´Calypso´), žlutá (´Aurelia´, ´Canary Bird´, ´Golden Fleece´), červená (´Triumphant´), lososově červená (´Ashford Red´), oranžová (´Éclatant´, ´La Lorraine´, ´Fireball´)

Celky sbírek

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/50111159>
- <http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=20025>

Grafické přílohy

