

Taxon Daphne mezereum

Název taxonu	Daphne mezereum
Vědecký název taxonu	Daphne mezereum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	lýkovec jedovatý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Daphne

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Sibiř, Írán, západní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý keř 25-200 cm, hustě nebo řidce větvený
Výhony	větve tlusté, lysé, ohebné, velmi pevné a pružné, nezlomitelné, letorosty chlupaté až plstnaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy nahločené na koncích větví, tenké podlouhle kopinaté až obkopinaté, 3-10 cm, živě zelené, rub naředlý
Květy	květy 5-10 mm světle karmínově červené až růžové, vzácně bílé, po 2-5 v úžlabí listů, silně vonné
Plody	plody dužnaté, červené, řidšeji žluté, velikosti hrachu, 5-8 mm široké, kulovité, v češuli neuzavřené, pecka černohnědá a kulovitá
Kůra a borka	kůra žlutavě šedá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	přistínění, S a SZ expozice

Faktor tepla	až do oblasti IV, S a SZ expozice
Faktor vody	středně vlhké půdy
Faktor půdy	středně živné a středně vlhké půdy

Užitné vlastnosti

Použití	trvalkové záhony, skalky, mezi nízké a stálezelené keře
---------	---

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Hřížení a Roubování
Odrůdy	Alba Plena' - květy plné, bílé až žlutobílé