

Taxon Vitis vinifera Regent

Název taxonu	Vitis vinifera Regent
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Regent’ (Re)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Gf. 64-198-3, AD 6, Dajána
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o německou odrůdu, vznikla křížením odrůd (‘Sylvánské zelené’ x ‘Müller Thurgau’) x ‘Chambourcin’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, spíše celokrajné s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je světleji zelený, slabě vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, kuželovitě-válcovitý hrozen, středně hustý; bobule je středně velká, kulatá, tmavě modrá
Semena	malá, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy

Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy s dostatkem vláhy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení

Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez

Podnož na chudších půdách Kober 125 AA či Börner, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína

Choroby a škůdci odolná k houbovým chorobám

Plodnost středně pozdní, pravidelná (výnos 6-10 t/ha)

Množení

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Popis vína víno je jemné, s nižším obsahem tříslovin, výrazné barvy, odrůdové chuti ovocného charakteru

Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 1\)](#)

Grafické přílohy

