

# Taxon Clematis 'Multi Blue'

Název taxonu	Clematis 'Multi Blue'
Vědecký název taxonu	Clematis
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Charles Noble</a>
Odrůda	'Multi Blue'
Český název	plamének
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Ranunculaceae</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. sport kultivaru 'The President', objevený v roce 1983 v Boskoope, Nizozemí

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	výška 2 m, popínavý
Výhony	tenké, hnědé, plstnatě chlupaté, hranaté, starší lysé, internodia dutá, starší dřevo na příčném řezu nápadně pórovité
Pupeny	vstřícné, malé, kuželovité, hustě bíle plstnaté, umístěné těsně pod ovíjivým vytvárajícím řapíkem
Listy	řapíkaté, lichospeřené, po 3 -5 lístků, s úponkovitými řapíky
Květenství	laty
Květy	plné, modrými (navy blue) květy, plno- květost zachovává i při opakovaném kvetení na nových výhonech, vnějších širších petalů 6 - 8, vnitřních mnoho, jsou užší a menší, jejichž konce jsou bíle zbarvené, první květy jsou velké v průměru 15 cm velké, druhé květy jsou poněkud menší
Plody	nažka s pématou čnělkou
Kůra a borka	hnědá

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Remontování	✓

**Nároky na stanoviště**

---

Faktor světla	světlomilný,
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilný, vyžadují však prístínění kořenů
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 5 - 7
Faktor vody	vlhko, ne však příliš zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, vhodné jsou živné, ne těžké půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

**Agrotechnické vlastnosti a požadavky**

---

Řez	kvete na bočních výhonech ložského dřeva, a na konci léta na vrcholech nových výhonů, proto na začátku jara ponechat jen silné výhony seříznuté k páru silných pupenů
-----	---

**Užitné vlastnosti**

---

Období hlavního estetického...	léto - výrazné květy
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, trvalkové záhony, vyžaduje oporu
Choroby a škůdci	Vadnutí Plaménku ( <i>Phoma clematidina</i> ): Rychlé odumírání listů, celých výhonů i rostlin. Padlí ( <i>Erysiphe polygoni</i> ): Bělavý povlak na listech měkkých výhonech i květech. Plíseň šedá ( <i>Botrytis cinerea</i> ): Poupata, květní stopky i stonky hnědnou, hnědý povlak plísně. Antraknoza Plaménku ( <i>Matssonina clematidis</i> ): Tmavěhnědé až černé skvrny často se šíří od čepele až podél středu listu. Mšice, Slimáci.

**Množení**

---

Množení	Řízkování, Polovyztřelé řízky, Dřevité řízky, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka	v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary rodu <i>Clematis</i> řízkování zelenými řízkami, na řízku ponecháváme min. 1 pár listů, řízky s bočním poraněním, méně rozšířenou metodou je robování, jako podnože je možno využít <i>C. viticella</i> L. eventuelně <i>C. vitalba</i> L.

**Celky sbírek**

---

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Poznámka matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 30 cm nad zemí)

Odkazy

- <http://www.clematisinternational.com>
- <http://www.guernsey-clematis.co.uk>
- <http://www.parkon.cz>
- <http://www.databaze.dendrologie.cz>
- <http://www.clematis.hull.ac.uk>