

Taxon Kirengeshoma palmata

Název taxonu	Kirengeshoma palmata
Vědecký název taxonu	Kirengeshoma palmata
Jména autorů, kteří taxon p...	Yatebe
Synonyma (zahradnický pou..	Kirengeshoma koreana Nakai
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hydrangeaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	japonská (Šikoku a Kjúšú), jihokorejská a východočínská (Če-ťiang a Anchuej) subtropická pohoří

Zařazení

Fytocenologický původ	údolí vlhkých horských lesů v 700 – 1800 metrů n. m
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	hylofyt, orgadofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá vzpřímeně rostoucí velkolistá bylina, 80 – 120 cm vysoká, svým habitem připomínající keř
Kořen	provazovité adventivní kořeny z krátkých robustních oddenků
Výhony	lodyhy vzpřímené, načervenalé, tupě čtyřhranné, uvnitř duté se vstřícnými křížmostojnými listy
Listy	výrazně řapíkaté listy se srdčitou bází bez palistů, s čepelemi v obrysu okrouhlými, ale hluboce a zubatě dlanitě laločnatými (3-10 laloků), až 0.2 m širokými, sytě zelenými, roztroušeně a přitiskle bělavě pýřitými; ve svrchní části lodyhy nápadně zmenšené, přisedlé a někdy až téměř celokrajné
Květenství	redukované vrcholíky, obvykle sestavené z 1-3 nicích květů
Květy	oboupohlavné, různobalné, pětičetné, srostloplátčné s kališními trubkami přirostlými k polospodním semeníkům, s pěti až k bázi rozsečenými, nepravidelně obvejčitými, hroditými, bledě žlutými, voskově masitými, asi 3 cm dlouhými korunními laloky a s patnácti tyčinkami ve třech přeslenech (vnitřní jsou zkrácené)

Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	mnohasemenné trojpouzdré nebo čtyřpouzdré tobolky, jen málo přes centimetr dlouhé, žebnaté
Semena	početná, plochá, bledě žlutá, až centimetr dlouhá, přesto poměrně lehká (450 semen v gramu osiva), nepravidelně křídlatě lemovaná
Možnost záměny taxonu (+..	v případě zamítnutí postavení korejských populací jako samostatného druhu jde o jediný druh svérázného a prakticky nezaměnitelného rodu
Vytrvalost	vytrvalá
Dlouhověkost	ve vlhkém polostínu dlouhověký druh
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	na slunci jen v trvale vlhkých půdách, v hlubším stínu přežívá, ale pomalu přirůstá, časem slábne a málo kvete; sucho a slunce nesnáší
Faktor tepla	ve stredoevropském klimatu obstojně mrazuvzdorná (Z5: cca - 25°C)
Faktor vody	mezofyt; prospívá při dostatku vody, ne však na trvale zamokřených stanovištích; přisušky toleruje jen krátkodobě
Faktor půdy	propustné, písčitohlinité, ale nevysychavé půdy bohaté organickými složkami, kyselé nebo neutrální pH 4.5-7.0), s nízkým obsahem solí (EC do 1.6 mS/cm)

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v pozdním létě a na podzim v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	podrosty a přistíněné okraje porostů dřevin, solitéra do trávníku, stinné partie soukromých zahrad
Choroby a škůdci	vcelku vzácně kořenové hniloby (Pythium, Rhizoctonia), z hmyzích škůdců nebezpeční krytonosci (Ceutorhynchus) a mšice (Aphis, Myzus), ve vlhkých oblastech plži (Arion, požírá především květy)
Růstové i jiné druhově spec..	trvalka dorůstající úhledných mohutných trsů, netradičního vzezření
Doporučený spon pro výsad..	solitéra nebo pro výsadby v malých skupinách (2-3 ks) s cílovým

prostorem cca 1m² na každou rostlinu

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Dělení trsů a Množení oddělků
Množení - poznámka	výsev je jedinou tržně efektivní metodou množení; osivo vzchází po stratifikaci (vystavení nízkým teplotám), je však jen omezeně dostupné
Konečné hrnky	obvykle dvoulitrové kontejnery
Květní tvorba	pravděpodobně dormantní - vývinu založených květů musí předcházet období nízkých teplot
Odrůdy	dosud žádné odrůdy

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Z 11: záhon 11 / ZF - Z - Akademická zahrada \(Z 11 a - vnitřní strana záhonu\)](#)

Ostatní

Dodavatel VUKOZ Průhonice

Grafické přílohy





