

Taxon Brassica oleracea var. italica

Název taxonu	Brassica oleracea var. italica
Vědecký název taxonu	Brassica oleracea var. italica
Jména autorů, kteří taxon p...	L., L., Alef, Plenck
Český název	brokolice
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	convar. botritis var. italica
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středomoří
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Košťálová zelenina
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro zdužnatělé fasciované květenství

Popisné a identifikační znaky

Listy	lyrovité nebo zpeřeně členěné, celokrajné, případně jemně pilovité, řapík s nepárovými bočními ouškatými úkrojky, čepele ploché, lysé, tuhé, zelené a šedozelené barvy, slabě ojíněné
Květy	žluté
Plody	šťíhla šešule s krátkým zobanem
Semena	HTS 2,5 - 3,3 g
Vytrvalost	jednoletá

Doba zrání

Začátek doby zrání	Květen
Konec doby zrání	Listopad
Doba zrání - poznámka	sklizeň : Raná 10. - 25. V., Letní 15.VII. - 15.VIII., Pozdní 20. IX. - 30. XI.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	snese bez poškození -6°C
Faktor vody	nutná pravidelná doplnková zálaha
Faktor půdy	humózní půdy biologicky činné, hlinité, vododržné, řepařské půdy, s dostatkem humusu, pH 6,8 - 7,5

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	vyslepnutí kvěťáku zúšobené nedostatkem molybdenu, propadání a hnědnutí středu růžic, antokyanizace růžic kvěťáků, mechovatění růžic kvěťáku, zlistnatění růžic kvěťáku, vyrová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i>), plíseň brukvovitých (<i>Peronospora parasitica</i>), alternárióvá skvrnitost brukvovitých (<i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i>), květílka zelná (<i>Delia radicum</i>), mšice zelná (<i>Brevicoryne brassicae</i>), dřepčík (<i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec (<i>Ceutorhynchus</i>), bělásek zelný (<i>Pieris brassicae</i>), bělásek řepový (<i>P. rapae</i>), můra zelná (<i>Mamestra brassicae</i>), můra kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>), osenice polní (<i>Agrotis segetum</i>), zápníček polní (<i>Plutella xylostella</i>), molice vlašťovičnicková (<i>Aleyrodes proletella</i>), bejlmorka zelná (<i>Contarinia nasturtii</i>), třásněnka (<i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	raná 0,4 x 0,5 m, letní 0,4 x 0,5, pozdní 0,4 - 0,5 x 0,5 m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)