

Taxon Miscanthus sinensis 'Gracillimus'

Název taxonu	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'
Vědecký název taxonu	Miscanthus sinensis
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Andersson
Odrůda	'Gracillimus'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonsko až Kurilské ostrovy; jeden z nejstarších kultivarů

Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva s krátkými oddenky, tvoří velmi hustý, sloupovitý, kompaktní trs úzkých listů, vysoký 120 - 160 cm, široký 80 - 90 cm v době vegetace; středně vysoký kultivar
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu Miscanthus)
Výhony	mnohačetné vzpřímené, hustě olistěné
Listy	listy pevné, velmi úzké (0,5 - 0,6 cm), žlábkovité, sytě zelené s bílým středovým žebrem, ostře špičaté, obloukovitě stočené. Listy spolu s lodyhami zůstávají dlouho do zimy zelené, později získávají nažedlou barvu; úzkolistý kultivar
Květenství	na rostlině se objevuje spíše vájimečně v teplých oblastech s dlouhým a teplým podzimem. Květenství je spíše na závalu, objevuje se mezi listy nebo těsně nad listy
Květy	klásek s osinou

Vytřvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Říjen
Konec doby kvetení	Listopad

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; mírný polostín toleruje; s úbytkem světla se lodyhy vytahují, jsou slabší
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů a vitality
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od červene do jara následujícího roku
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	jedna z nejstarších a nejpěstovanějších odrůd, cenná pro velmi jemnou texturu a elegantní charakter růstu
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití, listy k řezu. Po přenesení do tepla se stáčí. Dobře drží tvar i po usušení
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů velmi dobře drží tvar i v zimě, nerozklesávají se a tvoří zajímavé struktury. Listy se spirálovitě točí
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	dělením na jaře (duben) před rašením

Odrůdy Výchozí odrůda, ze které byly vyšlechtěny další odrůdy podobného vzhledu, ale podstatně ranější a tudíž v našich klimatických podmínkách i výrazně kvetoucí jako např. 'Graziella', 'Nippon', 'Silberspinne', 'Kleine Silberspinne'

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [C 2 a: záhon vlevo od hlavního vchodu po dveře / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C \(záhon pod lípou na Valtické \)](#)
- [O 14: záhon podél skleníku na straně ke... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2010

Výsev/výsadba na stanoviš... C 2a - jaro 2011; O 14 - 2010

Dodavatel mřemnožené ze sbírek ZF