

Taxon Vigna angularis

Název taxonu	Vigna angularis
Vědecký název taxonu	Vigna angularis
Jména autorů, kteří taxon p...	(Willdenow) W. F. Wight
Český název	Vigna azuki (adzuki)
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Vigna

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Listová a stonková zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená nebo poléhavá lodyha, 0,3 - 0,8 m
Listy	trojčetné s vejčitými až široce kopinatými lístky
Květy	bělavé, žluté nebo fialové
Plody	lusk 0,1 - 0,8 m
Semena	5 - 12 v lusku, elipsoidními tmavými semeny, 8 mm
Vytrvalost	jednoleté

Doba zrání

Doba zrání - poznámka sklizeň za 2 - 4 měsíce po výsevu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	vyžaduje teplé polohy, při 12 °C růst stagnuje, pod 5 °C odumírá, ideální teploty 22 °C
Faktor vody	doplňková závlaha podporuje nárůst výhonů, bezpodmínečná v době tvorby květů
Faktor půdy	nenáročná, preferuje lehčí půdu s dobrou propustností, spíše nižší obsah organické hmoty

Užitné vlastnosti

Použití zelenina

Doporučený spon pro výsad.. 0,4 x 0,2 - 0,4 m

Množení

Množení Přímý výsev

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)